

補足表 44 年末 PD 患者数および PD 導入患者数の推移, 2010-2017

腹膜透析患者数		2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
腹膜透析 (PD)	7,325	9,773	9,642	9,514	9,392	9,255	9,322	9,021	9,090
週1回のHD(F)等との併用	1,505								
週2回のHD(F)等との併用	155	年別 PD 導入患者数					2,197	1,946	2,117
週3回のHD(F)等との併用	37	(施設調査による集計)							
上記以外の併用	68								
合計	9,090								

(施設調査による集計)

補足表 45 PD 患者 性別と年齢, 2017

年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
15歳未満 (%)	43 (0.8)	43 (1.4)	86 (1.0)	0	86 (1.0)
15歳～	52 (0.9)	37 (1.2)	89 (1.0)	0	89 (1.0)
30歳～	359 (6.3)	208 (6.9)	567 (6.5)	0	567 (6.5)
45歳～	1,523 (26.8)	765 (25.5)	2,288 (26.4)	0	2,288 (26.4)
60歳～	2,564 (45.2)	1,186 (39.6)	3,750 (43.3)	0	3,750 (43.3)
75歳～	1,068 (18.8)	687 (22.9)	1,755 (20.2)	0	1,755 (20.2)
90歳～	65 (1.1)	69 (2.3)	134 (1.5)	0	134 (1.5)
合計 (%)	5,674 (100.0)	2,995 (100.0)	8,669 (100.0)	0	8,669 (100.0)
不明	0	0	0	0	0
記載なし	0	0	0	0	0
総計	5,674	2,995	8,669	0	8,669
平均	63.37	63.65	63.47		63.47
標準偏差	13.84	15.75	14.53		14.53

(患者調査による集計)

補足表 46 PD 患者 性別と PD 歴, 2017

PD 歴	男性	女性	合計	記載なし	総計
1年未満 (%)	1,026 (26.2)	425 (20.8)	1,451 (24.4)	0	1,451 (24.4)
1年～	787 (20.1)	377 (18.5)	1,164 (19.5)	0	1,164 (19.5)
2年～	1,029 (26.3)	559 (27.4)	1,588 (26.7)	0	1,588 (26.7)
4年～	552 (14.1)	294 (14.4)	846 (14.2)	0	846 (14.2)
6年～	267 (6.8)	164 (8.0)	431 (7.2)	0	431 (7.2)
8年～	119 (3.0)	105 (5.1)	224 (3.8)	0	224 (3.8)
10年～	138 (3.5)	116 (5.7)	254 (4.3)	0	254 (4.3)
合計 (%)	3,918 (100.0)	2,040 (100.0)	5,958 (100.0)	0	5,958 (100.0)
記載なし	1,756	955	2,711	0	2,711
総計	5,674	2,995	8,669	0	8,669
平均	3.04	3.67	3.26		3.26
標準偏差	3.04	3.61	3.26		3.26

(患者調査による集計)

補足表 47 PD患者 使用透析液の種類とPD歴(年), 2017

PD歴	1.5%液のみ (イコデキストリンなし)	1.5%液と 2.5%液の併用 (イコデキストリンなし)	2.5%液のみ (イコデキストリンなし)	4.25%液のみ (イコデキストリンなし)	イコデキストリン単独 (ブドウ糖使用なし)	1.5%液+ イコデキストリン	1.5%液+ 2.5%液+ イコデキストリン	2.5%液+ イコデキストリン	4.25%液+ イコデキストリン	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	737 (52.8)	94 (6.7)	50 (3.6)	1 (0.1)	23 (1.6)	360 (25.8)	64 (4.6)	65 (4.7)	2 (0.1)	1,396 (100.0)	7	48	1,451
1年～ (%)	425 (37.8)	90 (8.0)	36 (3.2)	4 (0.4)	19 (1.7)	345 (30.7)	105 (9.3)	99 (8.8)	1 (0.1)	1,124 (100.0)	4	36	1,164
2年～ (%)	494 (32.0)	166 (10.8)	37 (2.4)	0 (0.0)	18 (1.2)	436 (28.2)	186 (12.0)	206 (13.3)	1 (0.1)	1,544 (100.0)	3	41	1,588
4年～ (%)	217 (26.4)	111 (13.5)	26 (3.2)	0 (0.0)	2 (0.2)	231 (28.1)	145 (17.7)	88 (10.7)	1 (0.1)	821 (100.0)	6	19	846
6年～ (%)	97 (22.7)	85 (19.9)	23 (5.4)	0 (0.0)	1 (0.2)	102 (23.9)	74 (17.3)	45 (10.5)	0 (0.0)	427 (100.0)	0	4	431
8年～ (%)	43 (19.9)	41 (19.0)	11 (5.1)	0 (0.0)	1 (0.5)	49 (22.7)	47 (21.8)	24 (11.1)	0 (0.0)	216 (100.0)	2	6	224
10年～ (%)	39 (15.6)	67 (26.8)	15 (6.0)	1 (0.4)	0 (0.0)	41 (16.4)	54 (21.6)	32 (12.8)	1 (0.4)	250 (100.0)	1	3	254
合計 (%)	2,052 (35.5)	654 (11.3)	198 (3.4)	6 (0.1)	64 (1.1)	1,564 (27.1)	675 (11.7)	559 (9.7)	6 (0.1)	5,778 (100.0)	23	157	5,958
記載なし (%)	58 (36.9)	23 (14.6)	9 (5.7)	2 (1.3)	3 (1.9)	38 (24.2)	13 (8.3)	8 (5.1)	3 (1.9)	157 (100.0)	4	2,550	2,711
総計 (%)	2,110 (35.6)	677 (11.4)	207 (3.5)	8 (0.1)	67 (1.1)	1,602 (27.0)	688 (11.6)	567 (9.6)	9 (0.2)	5,935 (100.0)	27	2,707	8,669
平均	2.45	4.73	3.91	3.33	1.77	2.99	4.56	3.82	4.49	3.28	3.21	2.49	3.26
標準偏差	2.72	4.15	4.04	5.68	1.63	2.74	3.71	3.36	7.08	3.28	3.26	2.52	3.26

(患者調査による集計)

補足表 48 PD患者 2017年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)とPD歴(年), 2017

PD歴	0	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満 (%)	1,172 (89.2)	60 (4.6)	56 (4.3)	8 (0.6)	6 (0.5)	12 (0.9)	1,314 (100.0)	0	137	1,451	0.26	0.94
1年～ (%)	924 (83.4)	139 (12.5)	30 (2.7)	9 (0.8)	3 (0.3)	3 (0.3)	1,108 (100.0)	0	56	1,164	0.23	0.62
2年～ (%)	1,307 (86.3)	157 (10.4)	34 (2.2)	14 (0.9)	2 (0.1)	0 (0.0)	1,514 (100.0)	0	74	1,588	0.18	0.52
4年～ (%)	702 (85.7)	90 (11.0)	20 (2.4)	5 (0.6)	2 (0.2)	0 (0.0)	819 (100.0)	0	27	846	0.19	0.52
6年～ (%)	378 (89.4)	39 (9.2)	4 (0.9)	1 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.2)	423 (100.0)	0	8	431	0.13	0.44
8年～ (%)	200 (91.7)	15 (6.9)	3 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	218 (100.0)	0	6	224	0.10	0.34
10年～ (%)	205 (84.7)	31 (12.8)	4 (1.7)	1 (0.4)	0 (0.0)	1 (0.4)	242 (100.0)	0	12	254	0.21	0.72
合計 (%)	4,888 (86.7)	531 (9.4)	151 (2.7)	38 (0.7)	13 (0.2)	17 (0.3)	5,638 (100.0)	0	320	5,958	0.20	0.66
記載なし (%)	54 (93.1)	2 (3.4)	2 (3.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	58 (100.0)	0	2,653	2,711	0.10	0.41
総計 (%)	4,942 (86.8)	533 (9.4)	153 (2.7)	38 (0.7)	13 (0.2)	17 (0.3)	5,696 (100.0)	0	2,973	8,669	0.20	0.66
平均	3.30	3.76	2.46	2.68	1.75	1.51	3.31		2.32	3.26		
標準偏差	3.21	3.63	2.53	2.67	1.95	2.89	3.24		3.47	3.26		

(患者調査による集計)

* 個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は, 1.0未満の数値が0となるため, 「0」と表示しています。

補足表 49 PD患者 β 2-MG濃度とPD歴, 2017

PD歴	10 mg/L 未満	10 mg/L ～	15 mg/L ～	20 mg/L ～	25 mg/L ～	30 mg/L ～	35 mg/L ～	40 mg/L ～	45 mg/L ～	50 mg/L ～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満 (%)	23 (3.2)	169 (23.6)	237 (33.1)	150 (20.9)	80 (11.2)	27 (3.8)	19 (2.6)	7 (1.0)	4 (0.6)	1 (0.1)	717 (100.0)	734	1,451	19.68	7.06
1年～ (%)	14 (2.1)	80 (12.1)	152 (23.1)	133 (20.2)	97 (14.7)	88 (13.4)	53 (8.0)	22 (3.3)	8 (1.2)	12 (1.8)	659 (100.0)	505	1,164	24.47	9.48
2年～ (%)	12 (1.2)	69 (6.9)	145 (14.4)	201 (20.0)	194 (19.3)	181 (18.0)	120 (11.9)	50 (5.0)	23 (2.3)	12 (1.2)	1,007 (100.0)	581	1,588	27.49	9.63
4年～ (%)	4 (0.7)	20 (3.4)	50 (8.6)	82 (14.1)	105 (18.0)	134 (23.0)	94 (16.1)	52 (8.9)	22 (3.8)	20 (3.4)	583 (100.0)	263	846	30.94	9.60
6年～ (%)	2 (0.7)	7 (2.5)	13 (4.7)	35 (12.5)	45 (16.1)	51 (18.3)	71 (25.4)	32 (11.5)	12 (4.3)	11 (3.9)	279 (100.0)	152	431	32.97	9.49
8年～ (%)	1 (0.6)	4 (2.5)	4 (2.5)	16 (9.9)	25 (15.5)	32 (19.9)	37 (23.0)	27 (16.8)	8 (5.0)	7 (4.3)	161 (100.0)	63	224	33.99	9.14
10年～ (%)	2 (1.3)	2 (1.3)	3 (1.9)	8 (5.2)	27 (17.4)	34 (21.9)	40 (25.8)	23 (14.8)	10 (6.5)	6 (3.9)	155 (100.0)	99	254	35.01	9.21
合計 (%)	58 (1.6)	351 (9.9)	604 (17.0)	625 (17.6)	573 (16.1)	547 (15.4)	434 (12.2)	213 (6.0)	87 (2.4)	69 (1.9)	3,561 (100.0)	2,397	5,958	26.97	10.23
記載なし (%)	6 (1.7)	18 (5.2)	38 (11.0)	46 (13.4)	66 (19.2)	74 (21.5)	52 (15.1)	24 (7.0)	15 (4.4)	5 (1.5)	344 (100.0)	2,367	2,711	29.52	9.74
総計 (%)	64 (1.6)	369 (9.4)	642 (16.4)	671 (17.2)	639 (16.4)	621 (15.9)	486 (12.4)	237 (6.1)	102 (2.6)	74 (1.9)	3,905 (100.0)	4,764	8,669	27.20	10.22
平均	2.23	1.69	1.87	2.78	3.76	4.39	5.23	5.75	5.51	5.22	3.51	2.89	3.26		
標準偏差	2.46	2.05	1.82	2.41	3.34	3.32	3.72	3.88	4.02	3.29	3.26	3.23	3.26		

(患者調査による集計)