

補足表 54 入院の有無と年齢 性別, 2017

男性

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	4 (12.5)	28 (87.5)	32 (100.0)	0	14	46
15歳～ (%)	312 (74.6)	106 (25.4)	418 (100.0)	2	183	603
30歳～ (%)	4,697 (72.9)	1,750 (27.1)	6,447 (100.0)	13	2,467	8,927
45歳～ (%)	20,249 (68.0)	9,548 (32.0)	29,797 (100.0)	75	11,003	40,875
60歳～ (%)	40,606 (59.4)	27,720 (40.6)	68,326 (100.0)	176	23,994	92,496
75歳～ (%)	25,013 (53.4)	21,794 (46.6)	46,807 (100.0)	100	15,854	62,761
90歳～ (%)	1,160 (49.5)	1,184 (50.5)	2,344 (100.0)	0	818	3,162
合計 (%)	92,041 (59.7)	62,130 (40.3)	154,171 (100.0)	366	54,333	208,870
不明 (%)	0	0	0	0	0	0
記載なし (%)	0	0	0	0	0	0
総計 (%)	92,041 (59.7)	62,130 (40.3)	154,171 (100.0)	366	54,333	208,870
平均	66.49	69.62	67.75	66.65	67.28	67.63
標準偏差	12.60	11.75	12.36	11.91	12.55	12.41

(患者調査による集計)

女性

年齢	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	5 (17.2)	24 (82.8)	29 (100.0)	0	17	46
15歳～ (%)	134 (66.0)	69 (34.0)	203 (100.0)	1	106	310
30歳～ (%)	1,905 (70.6)	792 (29.4)	2,697 (100.0)	4	1,056	3,757
45歳～ (%)	8,620 (68.4)	3,978 (31.6)	12,598 (100.0)	25	4,554	17,177
60歳～ (%)	21,383 (60.6)	13,927 (39.4)	35,310 (100.0)	70	12,056	47,436
75歳～ (%)	15,305 (50.5)	14,998 (49.5)	30,303 (100.0)	54	10,051	40,408
90歳～ (%)	1,139 (43.5)	1,481 (56.5)	2,620 (100.0)	5	887	3,512
合計 (%)	48,491 (57.9)	35,269 (42.1)	83,760 (100.0)	159	28,727	112,648
不明 (%)	0	0	0	0	0	0
記載なし (%)	0 (0.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	0	1	2
総計 (%)	48,491 (57.9)	35,270 (42.1)	83,761 (100.0)	159	28,728	112,648
平均	68.50	72.21	70.06	69.87	69.50	69.92
標準偏差	12.51	11.97	12.42	11.96	12.79	12.52

(患者調査による集計)

補足表 55 入院の有無と透析歴 性別, 2017

男性

入院の有無	5年未満	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	30年～	35年～	40年～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	44,418 (58.1)	23,617 (61.0)	11,317 (60.6)	5,993 (62.6)	3,367 (64.5)	1,726 (62.9)	916 (60.4)	481 (55.5)	176 (52.9)	92,011 (59.7)	30 (29.7)	0	92,041 (59.7)	7.04	7.21
あり (%)	31,976 (41.9)	15,115 (39.0)	7,373 (39.4)	3,583 (37.4)	1,851 (35.5)	1,017 (37.1)	601 (39.6)	386 (44.5)	157 (47.1)	62,059 (40.3)	71 (70.3)	0	62,130 (40.3)	6.54	7.25
合計 (%)	76,394 (100.0)	38,732 (100.0)	18,690 (100.0)	9,576 (100.0)	5,218 (100.0)	2,743 (100.0)	1,517 (100.0)	867 (100.0)	333 (100.0)	154,070 (100.0)	101 (100.0)	0	154,171 (100.0)	6.84	7.23
不明	198	81	36	19	16	9	5	2	0	366	0	0	366	6.52	7.58
記載なし	27,114	13,751	6,377	3,412	1,724	944	552	281	140	54,295	38	0	54,333	6.78	7.19
総計	103,706	52,564	25,103	13,007	6,958	3,696	2,074	1,150	473	208,731	139	0	208,870	6.82	7.22

(患者調査による集計)

女性

入院の有無	5年未満	5年～	10年～	15年～	20年～	25年～	30年～	35年～	40年～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	20,020 (55.4)	11,779 (59.1)	6,888 (60.1)	4,261 (62.0)	2,571 (61.5)	1,539 (61.5)	852 (57.8)	422 (53.6)	153 (43.7)	48,485 (57.9)	6 (12.8)	0	48,491 (57.9)	8.60	8.25
あり (%)	16,124 (44.6)	8,155 (40.9)	4,578 (39.9)	2,611 (38.0)	1,612 (38.5)	964 (38.5)	622 (42.2)	366 (46.4)	197 (56.3)	35,229 (42.1)	41 (87.2)	0	35,270 (42.1)	8.00	8.48
合計 (%)	36,144 (100.0)	19,934 (100.0)	11,466 (100.0)	6,872 (100.0)	4,183 (100.0)	2,503 (100.0)	1,474 (100.0)	788 (100.0)	350 (100.0)	83,714 (100.0)	47 (100.0)	0	83,761 (100.0)	8.35	8.36
不明	75	34	29	7	5	3	5	1	0	159	0	0	159	7.39	7.91
記載なし	12,491	7,058	3,799	2,353	1,390	813	473	232	98	28,707	20	1	28,728	8.16	8.14
総計	48,710	27,026	15,294	9,232	5,578	3,319	1,952	1,021	448	112,580	67	1	112,648	8.30	8.30

(患者調査による集計)

補足表 56 入院の有無と治療方法 性別, 2017

男性

入院の有無	施設血液透析	血液透析濾過	血液濾過	血液吸着透析	在宅血液透析	腹膜透析	合計	記載なし	総計
なし (%)	62,645 (58.6)	27,430 (64.0)	4 (80.0)	285 (55.0)	275 (79.9)	1,402 (39.8)	92,041 (59.7)	0	92,041 (59.7)
あり (%)	44,294 (41.4)	15,411 (36.0)	1 (20.0)	233 (45.0)	69 (20.1)	2,122 (60.2)	62,130 (40.3)	0	62,130 (40.3)
合計 (%)	106,939 (100.0)	42,841 (100.0)	5 (100.0)	518 (100.0)	344 (100.0)	3,524 (100.0)	154,171 (100.0)	0	154,171 (100.0)
不明	329	19	0	0	1	17	366	0	366
記載なし	34,871	16,967	7	177	178	2,133	54,333	0	54,333
総計	142,139	59,827	12	695	523	5,674	208,870	0	208,870

(患者調査による集計)

女性

入院の有無	施設血液透析	血液透析濾過	血液濾過	血液吸着透析	在宅血液透析	腹膜透析	合計	記載なし	総計
なし (%)	32,841 (56.5)	14,437 (62.4)	5 (83.3)	322 (57.5)	67 (70.5)	819 (44.9)	48,491 (57.9)	0	48,491 (57.9)
あり (%)	25,302 (43.5)	8,696 (37.6)	1 (16.7)	238 (42.5)	28 (29.5)	1,005 (55.1)	35,270 (42.1)	0	35,270 (42.1)
合計 (%)	58,143 (100.0)	23,133 (100.0)	6 (100.0)	560 (100.0)	95 (100.0)	1,824 (100.0)	83,761 (100.0)	0	83,761 (100.0)
不明	141	8	0	0	1	9	159	0	159
記載なし	18,337	8,980	11	177	61	1,162	28,728	0	28,728
総計	76,621	32,121	17	737	157	2,995	112,648	0	112,648

(患者調査による集計)

補足表 57 入院の有無が「あり」の患者 入院理由と性別, 2017

性別	入院理由 (1人につき3つまで回答可)											入院理由に 回答がある 患者数	入院理由に 回答がない 患者数	合計
	心疾患	大動脈・ 末梢血管 疾患	脳血管 疾患	感染症	癌	腎移植	整形外科 疾患	内分泌	バスキュ ラーアク セス	その他	不明			
男性 ※1 (%)	13,758 (24.0)	3,985 (7.0)	3,203 (5.6)	6,458 (11.3)	2,616 (4.6)	96 (0.2)	4,677 (8.2)	441 (0.8)	13,469 (23.5)	22,317 (38.9)	424 (0.7)	57,331	4,799	62,130
女性 (%)	5,679 (17.5)	1,507 (4.6)	1,757 (5.4)	3,372 (10.4)	987 (3.0)	45 (0.1)	4,081 (12.6)	310 (1.0)	9,033 (27.9)	13,039 (40.2)	249 (0.8)	32,417	2,853	35,270
※2 延べ合計 (%)	19,437 (21.7)	5,492 (6.1)	4,960 (5.5)	9,830 (11.0)	3,603 (4.0)	141 (0.2)	8,758 (9.8)	751 (0.8)	22,502 (25.1)	35,356 (39.4)	673 (0.7)	89,748	7,652	94,000
記載なし (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
※2 延べ総計 (%)	19,437 (21.7)	5,492 (6.1)	4,960 (5.5)	9,830 (11.0)	3,603 (4.0)	141 (0.2)	8,758 (9.8)	751 (0.8)	22,502 (25.1)	35,356 (39.4)	673 (0.7)	89,748	7,652	97,400

(患者調査による集計)

※1 数値下のかっこ内%は、行方向の「入院理由に回答がある患者数」に対する割合です。入院理由は1人につき3つまで回答可としたため、割合の合計は100%ではありません。

※2 入院理由は1人について3つまで回答可としたため、合計数は回答の延べ合計、総計数は回答の延べ総計です。回答患者数ではないことにご注意ください。

補足表 58 入院の有無が「あり」の患者 入院理由と年齢, 2017

年齢	入院理由 (1人につき3つまで回答可)											入院理由に回答がある患者数	入院理由に回答がない患者数	合計
	心疾患	大動脈・末梢血管疾患	脳血管疾患	感染症	癌	腎移植	整形外科疾患	内分泌	バスキュラーアクセス	その他	不明			
※1 15歳未満 (%)	2 (3.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	20 (38.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.9)	0 (0.0)	1 (1.9)	40 (76.9)	0 (0.0)	52	0	52
15歳～ (%)	18 (11.2)	3 (1.9)	0 (0.0)	30 (18.6)	5 (3.1)	10 (6.2)	4 (2.5)	3 (1.9)	52 (32.3)	78 (48.4)	1 (0.6)	161	14	175
30歳～ (%)	339 (14.6)	64 (2.8)	101 (4.4)	287 (12.4)	59 (2.5)	25 (1.1)	109 (4.7)	55 (2.4)	782 (33.7)	936 (40.3)	13 (0.6)	2,320	222	2,542
45歳～ (%)	2,790 (22.5)	753 (6.1)	633 (5.1)	1,226 (9.9)	381 (3.1)	44 (0.4)	924 (7.4)	194 (1.6)	3,378 (27.2)	4,731 (38.1)	74 (0.6)	12,425	1,101	13,526
60歳～ (%)	9,010 (23.4)	2,673 (7.0)	2,229 (5.8)	4,177 (10.9)	1,841 (4.8)	46 (0.1)	3,713 (9.7)	328 (0.9)	9,396 (24.4)	14,408 (37.5)	261 (0.7)	38,456	3,191	41,647
75歳～ (%)	6,931 (20.5)	1,928 (5.7)	1,876 (5.5)	3,764 (11.1)	1,278 (3.8)	16 (0.0)	3,666 (10.8)	165 (0.5)	8,342 (24.6)	13,994 (41.3)	301 (0.9)	33,875	2,917	36,792
90歳～ (%)	347 (14.1)	71 (2.9)	121 (4.9)	326 (13.3)	39 (1.6)	0 (0.0)	341 (13.9)	6 (0.2)	551 (22.4)	1,168 (47.5)	23 (0.9)	2,458	207	2,665
※2 延べ合計 (%)	19,437 (21.7)	5,492 (6.1)	4,960 (5.5)	9,830 (11.0)	3,603 (4.0)	141 (0.2)	8,758 (9.8)	751 (0.8)	22,502 (25.1)	35,356 (39.4)	673 (0.7)	89,747	7,652	97,399
不明 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	1	0	1
※2 延べ総計 (%)	19,437 (21.7)	5,492 (6.1)	4,960 (5.5)	9,830 (11.0)	3,603 (4.0)	141 (0.2)	8,758 (9.8)	751 (0.8)	22,502 (25.1)	35,356 (39.4)	673 (0.7)	89,748	7,652	97,400
平均	70.20	70.21	70.96	70.80	70.58	55.13	72.43	64.23	70.07	70.99	72.57	70.56	70.51	70.56
標準偏差	10.90	10.21	11.10	12.43	10.06	15.51	10.96	12.68	12.32	12.23	11.48	11.88	12.06	11.90

(患者調査による集計)

※1 数値下のかっこ内%は、行方向の「入院理由に回答がある患者数」に対する割合です。入院理由は1人につき3つまで回答可としたため、割合の合計は100%とは限りません。

※2 入院理由は1人について3つまで回答可としたため、合計数は回答の延べ合計、総計数は回答の延べ総計です。回答患者数ではないことにご注意ください。

補足表 59 入院の有無が「あり」の患者 入院理由と治療方法, 2017

治療方法	入院理由 (1人につき3つまで回答可)											入院理由に回答がある患者数	入院理由に回答がない患者数	合計
	心疾患	大動脈・末梢血管疾患	脳血管疾患	感染症	癌	腎移植	整形外科疾患	内分泌	バスキュラーアクセス	その他	不明			
施設血液透析 ※1 (%)	13,601 (21.2)	3,918 (6.1)	3,716 (5.8)	6,841 (10.7)	2,572 (4.0)	97 (0.2)	6,135 (9.6)	504 (0.8)	16,681 (26.0)	25,517 (39.8)	465 (0.7)	64,184	5,412	69,596
血液透析濾過 (%)	5,293 (24.0)	1,505 (6.8)	1,133 (5.1)	2,208 (10.0)	958 (4.3)	40 (0.2)	2,400 (10.9)	220 (1.0)	5,424 (24.6)	7,796 (35.3)	200 (0.9)	22,076	2,031	24,107
血液濾過 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	2	0	2
血液吸着透析 (%)	80 (18.4)	24 (5.5)	18 (4.1)	49 (11.3)	19 (4.4)	1 (0.2)	106 (24.4)	6 (1.4)	71 (16.3)	149 (34.3)	0 (0.0)	435	36	471
在宅血液透析 (%)	14 (16.1)	1 (1.1)	2 (2.3)	16 (18.4)	5 (5.7)	0 (0.0)	6 (6.9)	1 (1.1)	17 (19.5)	36 (41.4)	0 (0.0)	87	10	97
腹膜透析 (%)	449 (15.1)	44 (1.5)	90 (3.0)	716 (24.2)	49 (1.7)	3 (0.1)	111 (3.7)	20 (0.7)	309 (10.4)	1,857 (62.7)	8 (0.3)	2,964	163	3,127
※2 延べ合計 (%)	19,437 (21.7)	5,492 (6.1)	4,960 (5.5)	9,830 (11.0)	3,603 (4.0)	141 (0.2)	8,758 (9.8)	751 (0.8)	22,502 (25.1)	35,356 (39.4)	673 (0.7)	89,748	7,652	97,400
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
※2 延べ総計 (%)	19,437 (21.7)	5,492 (6.1)	4,960 (5.5)	9,830 (11.0)	3,603 (4.0)	141 (0.2)	8,758 (9.8)	751 (0.8)	22,502 (25.1)	35,356 (39.4)	673 (0.7)	89,748	7,652	97,400

(患者調査による集計)

※1 数値下のかっこ内%は、行方向の「入院理由に回答がある患者数」に対する割合です。入院理由は1人につき3つまで回答可としたため、割合の合計は100%とは限りません。

※2 入院理由は1人について3つまで回答可としたため、合計数は回答の延べ合計、総計数は回答の延べ総計です。回答患者数ではないことにご注意ください。