


4) 年末患者の現状

(3) 年末患者の主要原疾患の割合推移 (図表14)



年	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
糖尿病性腎症	7.4	8.4	9.4	10.5	11.7	12.8	14.0	14.9	16.4	17.1	18.2	19.2
慢性糸球体腎炎	74.5	72.1	72.3	70.6	69.4	67.9	65.9	64.1	61.7	60.4	58.8	57.7
腎硬化症	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
多発性嚢胞腎	2.7	2.9	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2
慢性腎盂腎炎	3.1	3.3	2.6	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8
急速進行性糸球体腎炎	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
SLE腎炎	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
不明	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9	3.1

年	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
糖尿病性腎症	20.4	21.6	22.7	24.0	25.1	26.0	27.2	28.1	29.2	30.2	31.4	32.3	33.4
慢性糸球体腎炎	56.6	55.4	54.1	52.5	51.1	49.7	49.6	48.2	46.6	45.1	43.6	42.2	40.4
腎硬化症	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.8	5.0	5.1	5.3	5.7	5.9	6.2	6.5
多発性嚢胞腎	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.3	3.4	3.4
慢性腎盂腎炎	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
急速進行性糸球体腎炎	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
SLE腎炎	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
不明	3.2	3.6	3.9	4.2	4.4	5.0	5.6	5.9	6.3	6.4	6.6	7.0	7.4

患者調査による集計

解説

年末患者の主要原疾患の推移

経年的な年末患者の主要原疾患の推移をみると、慢性糸球体腎炎の減少傾向は明らかで2007年末では40.4%と前年より1.8%減少した。一方、糖尿病性腎症は着実に上昇し、2007年末には33.4%と前年より1.1%増加した。1998年に糖尿病性腎症が導入原疾患の第一位となつてから、糖尿病性腎症患者は増加の一途であるので、年末患者においても数年後には糖尿病性腎症患者が第一位となる可能性も否定できない。第三位は原疾患不明で、第四位は腎硬化症である。その他、多発性嚢胞腎、慢性腎盂腎炎、SLE腎炎、急速進行性糸球体腎炎などの頻度は例年通りの数値で推移している。