


## 5) 死亡原因

(2) 導入患者の死亡年齢層別死因分布 (図表20)



死因	～44歳	45歳～64歳	65歳～74歳	75歳～84歳	85歳～	合計	不明	記載なし	総計
心不全 (%)	5 (25.0)	45 (19.4)	102 (20.7)	235 (26.9)	147 (27.2)	534 (24.7)	0	0	534 (24.7)
脳血管障害 (%)	0 (0.0)	14 (6.0)	41 (8.3)	51 (5.8)	18 (3.3)	124 (5.7)	0	0	124 (5.7)
感染症 (%)	5 (25.0)	54 (23.3)	118 (23.9)	218 (25.0)	162 (30.0)	557 (25.8)	0	0	557 (25.8)
消化管出血 (%)	0 (0.0)	5 (2.2)	10 (2.0)	12 (1.4)	10 (1.9)	37 (1.7)	0	0	37 (1.7)
悪性腫瘍 (%)	5 (25.0)	39 (16.8)	78 (15.8)	86 (9.9)	28 (5.2)	236 (10.9)	0	0	236 (10.9)
悪液質/尿毒症 (%)	0 (0.0)	11 (4.7)	17 (3.4)	42 (4.8)	36 (6.7)	106 (4.9)	0	0	106 (4.9)
心筋梗塞 (%)	0 (0.0)	8 (3.4)	16 (3.2)	23 (2.6)	14 (2.6)	61 (2.8)	0	0	61 (2.8)
カリウム中毒/頓死 (%)	0 (0.0)	6 (2.6)	7 (1.4)	14 (1.6)	4 (0.7)	31 (1.4)	0	0	31 (1.4)
その他 (%)	3 (15.0)	29 (12.5)	63 (12.8)	126 (14.4)	93 (17.2)	314 (14.6)	0	0	314 (14.5)
不明 (%)	2 (10.0)	21 (9.1)	41 (8.3)	66 (7.6)	28 (5.2)	158 (7.3)	1 (100.0)	0	159 (7.4)
合計 (%)	20 (100.0)	232 (100.0)	493 (100.0)	873 (100.0)	540 (100.0)	2,158 (100.0)	1 (100.0)	0	2,159 (100.0)
記載なし	0	1	0	1	1	3	0	0	3
総計	20	233	493	874	541	2,161	1	0	2,162

患者調査による集計

### 解説

透析導入患者における、各年齢層別の死因の内訳を集計した。44歳以下のカテゴリは少人数である事を考慮すると、心不全、感染症、悪液質/尿毒症により死亡した患者の全死亡患者に占める割合は高齢になるに従って増加した。一方、悪性腫瘍は高齢になるほど死亡患者に占める割合は減少した。