


## 5) 死亡原因

### (4) 2015年死亡患者の死亡原因分類 (図表22)



死因	男性	女性	合計	記載なし	総計	死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	4,720 (24.8)	2,824 (28.1)	7,544 (26.0)	0	7,544 (26.0)	自殺/拒否 (%)	155 (0.8)	57 (0.6)	212 (0.7)	0	212 (0.7)
脳血管障害 (%)	1,188 (6.3)	728 (7.2)	1,916 (6.6)	0	1,916 (6.6)	腸閉塞 (%)	194 (1.0)	113 (1.1)	307 (1.1)	0	307 (1.1)
感染症 (%)	4,286 (22.6)	2,107 (20.9)	6,393 (22.0)	0	6,393 (22.0)	肺血栓/肺塞栓 (%)	42 (0.2)	30 (0.3)	72 (0.2)	0	72 (0.2)
消化管出血 (%)	279 (1.5)	142 (1.4)	421 (1.4)	0	421 (1.4)	災害・事故死 (%)	94 (0.5)	34 (0.3)	128 (0.4)	0	128 (0.4)
悪性腫瘍 (%)	2,013 (10.6)	704 (7.0)	2,717 (9.3)	0	2,717 (9.3)	その他 (%)	1,663 (8.8)	1,111 (11.0)	2,774 (9.5)	0	2,774 (9.5)
悪液質/尿毒症 (%)	740 (3.9)	599 (6.0)	1,339 (4.6)	0	1,339 (4.6)	不明 (%)	2,012 (10.6)	956 (9.5)	2,968 (10.2)	0	2,968 (10.2)
心筋梗塞 (%)	867 (4.6)	378 (3.8)	1,245 (4.3)	0	1,245 (4.3)	合計 (%)	18,997 (100.0)	10,067 (100.0)	29,064 (100.0)	0	29,064 (100.0)
カリウム中毒/頓死 (%)	538 (2.8)	210 (2.1)	748 (2.6)	0	748 (2.6)	記載なし	11	14	25	0	25
肝硬変症 (%)	206 (1.1)	74 (0.7)	280 (1.0)	0	280 (1.0)	総計	19,008	10,081	29,089	0	29,089

患者調査による集計

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#### 解説

2015年の施設調査票では、31,068人の死亡が報告されている。そのうち患者調査表に死亡原因と性別が記載された29,064人で検討すると、男性では心不全(24.8%)、感染症(22.6%)、悪性腫瘍(10.6%)、脳血管障害(6.3%)の順であった。女性では心不全(28.1%)、感染症(20.9%)、脳血管障害(7.2%)、悪性腫瘍(7.0%)の順であった。全体では心不全(26.0%)、感染症(22.0%)、悪性腫瘍(9.3%)、脳血管障害(6.6%)の順であった。性別ごと、全体の死因ともその順番は2014年と変わらなかった。心不全、脳血管障害、心筋梗塞を併せた心血管疾患の割合は、全体で36.8%、男性では35.7%、女性では39.0%であった。