


## 5) 死亡原因

(5) 2015年死亡患者の年齢層別死因分布 (図表23)



死因	~44歳	45歳~64歳	65歳~74歳	75歳~84歳	85歳~	合計	不明	記載なし	総計
心不全 (%)	48 (22.7)	728 (21.9)	1,960 (24.8)	2,905 (26.2)	1,901 (29.0)	7,542 (26.0)	2 (18.2)	0	7,544 (26.0)
脳血管障害 (%)	27 (12.8)	373 (11.2)	568 (7.2)	666 (6.0)	282 (4.3)	1,916 (6.6)	0	0	1,916 (6.6)
感染症 (%)	39 (18.5)	528 (15.9)	1,716 (21.7)	2,576 (23.3)	1,533 (23.4)	6,392 (22.0)	1 (9.1)	0	6,393 (22.0)
消化管出血 (%)	1 (0.5)	59 (1.8)	122 (1.5)	162 (1.5)	77 (1.2)	421 (1.4)	0	0	421 (1.4)
悪性腫瘍 (%)	15 (7.1)	362 (10.9)	911 (11.5)	1,004 (9.1)	425 (6.5)	2,717 (9.4)	0	0	2,717 (9.3)
悪液質/尿毒症 (%)	2 (0.9)	70 (2.1)	248 (3.1)	521 (4.7)	498 (7.6)	1,339 (4.6)	0	0	1,339 (4.6)
心筋梗塞 (%)	10 (4.7)	205 (6.2)	392 (5.0)	452 (4.1)	186 (2.8)	1,245 (4.3)	0	0	1,245 (4.3)
カリウム中毒/頓死 (%)	13 (6.2)	168 (5.1)	225 (2.9)	240 (2.2)	102 (1.6)	748 (2.6)	0	0	748 (2.6)
その他 (%)	28 (13.3)	398 (12.0)	950 (12.0)	1,465 (13.2)	929 (14.2)	3,770 (13.0)	3 (27.3)	0	3,774 (13.0)
不明 (%)	28 (13.3)	432 (13.0)	800 (10.1)	1,078 (9.7)	625 (9.5)	2,963 (10.2)	5 (45.5)	0	2,968 (10.2)
合計 (%)	211 (100.0)	3,323 (100.0)	7,892 (100.0)	11,069 (100.0)	6,558 (100.0)	29,053 (100.0)	11 (100.0)	0	29,064 (100.0)
記載なし	0	3	6	8	8	25	0	0	25
総計	211	3,326	7,898	11,077	6,566	29,078	11	0	29,089

患者調査による集計

### 解説

透析患者全体で、死亡患者の各年齢層別の死因の内訳を集計した。44歳以下のカテゴリは少人数である事を考慮すると、心不全、感染症、悪液質/尿毒症により死亡した患者の全死亡患者に占める割合は高齢になるに従って増加した。一方、脳血管障害、カリウム中毒/頓死による死亡の割合は高齢になるほど減少した。