

補足表 33 年末 PD 患者数および PD 導入患者数の推移, 2010-2018

腹膜透析患者数		2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
腹膜透析 (PD)	7,582	9,773	9,642	9,514	9,392	9,255	9,322	9,021	9,090	9,445
週1回のHD(F)等との併用	1,621									
週2回のHD(F)等との併用	142						2,197	1,946	2,117	2,293
週3回のHD(F)等との併用	30									
上記以外の併用	70	(施設調査による集計)								
合計	9,445									

(施設調査による集計)

補足表 34 PD 患者 年齢と性別, 2018

年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
15歳未満 (%)	48 (0.8)	35 (1.1)	83 (0.9)	0	83 (0.9)
15歳～ (%)	55 (0.9)	41 (1.3)	96 (1.1)	0	96 (1.1)
30歳～ (%)	376 (6.3)	216 (7.0)	592 (6.5)	0	592 (6.5)
45歳～ (%)	1,543 (25.8)	805 (26.0)	2,348 (25.9)	0	2,348 (25.9)
60歳～ (%)	2,658 (44.5)	1,193 (38.5)	3,851 (42.5)	0	3,851 (42.5)
75歳～ (%)	1,213 (20.3)	724 (23.4)	1,937 (21.4)	0	1,937 (21.4)
90歳～ (%)	79 (1.3)	83 (2.7)	162 (1.8)	0	162 (1.8)
合計 (%)	5,972 (100.0)	3,097 (100.0)	9,069 (100.0)	0	9,069 (100.0)
不明	0	0	0	0	0
記載なし	0	0	0	0	0
総計	5,972	3,097	9,069	0	9,069
平均	63.74	64.04	63.84		63.84
標準偏差	13.94	15.65	14.55		14.55

(患者調査による集計)

補足表 35 PD 患者 PD 歴と性別, 2018

PD 歴	男性	女性	合計	記載なし	総計
1年未満 (%)	1,162 (28.3)	541 (25.1)	1,703 (27.2)	0	1,703 (27.2)
1年～ (%)	862 (21.0)	375 (17.4)	1,237 (19.8)	0	1,237 (19.8)
2年～ (%)	1,006 (24.5)	580 (27.0)	1,586 (25.3)	0	1,586 (25.3)
4年～ (%)	565 (13.8)	289 (13.4)	854 (13.6)	0	854 (13.6)
6年～ (%)	270 (6.6)	161 (7.5)	431 (6.9)	0	431 (6.9)
8年～ (%)	117 (2.9)	90 (4.2)	207 (3.3)	0	207 (3.3)
10年～ (%)	123 (3.0)	116 (5.4)	239 (3.8)	0	239 (3.8)
合計 (%)	4,105 (100.0)	2,152 (100.0)	6,257 (100.0)	0	6,257 (100.0)
記載なし	1,867	945	2,182	0	2,182
総計	5,972	3,097	9,069	0	9,069
平均	2.89	3.40	3.07		3.07
標準偏差	2.89	3.47	3.11		3.11

(患者調査による集計)

補足表 36 PD患者 PD歴とイコデキストリン透析液使用の有無，2018

PD歴	なし	あり	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	835 (53.2)	736 (46.8)	1,571 (100.0)	40	92	1,703
1年～ (%)	565 (47.2)	633 (52.8)	1,198 (100.0)	7	32	1,237
2年～ (%)	588 (39.0)	920 (61.0)	1,508 (100.0)	9	69	1,586
4年～ (%)	337 (41.3)	478 (58.7)	815 (100.0)	2	37	854
6年～ (%)	163 (38.9)	256 (61.1)	419 (100.0)	1	11	431
8年～ (%)	91 (46.2)	106 (53.8)	197 (100.0)	3	7	207
10年～ (%)	123 (53.5)	107 (46.5)	230 (100.0)	1	8	239
合計 (%)	2,702 (45.5)	3,236 (54.5)	5,938 (100.0)	63	256	6,257
記載なし (%)	135 (47.2)	151 (52.8)	286 (100.0)	2	2,524	2,812
総計 (%)	2,837 (45.6)	3,387 (54.4)	6,224 (100.0)	65	2,780	9,069
平均	2.98	3.19	3.10	1.64	2.77	3.07
標準偏差	3.35	2.91	3.12	2.42	2.88	3.11

(患者調査による集計)

補足表 37 PD患者 PD歴と2018年中の患者毎の腹膜炎発症率（回/1患者・年）^{*}，2018

PD歴	0 回/1患者・年	1.0～ 回/1患者・年	2.0～ 回/1患者・年	3.0～ 回/1患者・年	4.0～ 回/1患者・年	5.0～ 回/1患者・年	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
1年未満 (%)	1,340 (90.7)	55 (3.7)	34 (2.3)	14 (0.9)	14 (0.9)	20 (1.4)	1,477 (100.0)	0	226	1,703	0.29	1.24
1年～ (%)	1,013 (83.9)	148 (12.3)	34 (2.8)	8 (0.7)	3 (0.2)	2 (0.2)	1,208 (100.0)	0	29	1,237	0.22	0.60
2年～ (%)	1,287 (84.1)	192 (12.5)	37 (2.4)	9 (0.6)	5 (0.3)	0 (0.0)	1,530 (100.0)	0	56	1,586	0.21	0.54
4年～ (%)	750 (90.1)	65 (7.8)	10 (1.2)	5 (0.6)	2 (0.2)	0 (0.0)	832 (100.0)	0	22	854	0.13	0.45
6年～ (%)	368 (87.6)	42 (10.0)	3 (0.7)	5 (1.2)	0 (0.0)	2 (0.5)	420 (100.0)	0	11	431	0.17	0.57
8年～ (%)	176 (87.1)	20 (9.9)	5 (2.5)	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	202 (100.0)	0	5	207	0.17	0.50
10年～ (%)	211 (89.8)	21 (8.9)	2 (0.9)	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	235 (100.0)	0	4	239	0.12	0.38
合計 (%)	5,145 (87.1)	543 (9.2)	125 (2.1)	42 (0.7)	25 (0.4)	24 (0.4)	5,904 (100.0)	0	353	6,257	0.21	0.77
記載なし (%)	133 (84.7)	21 (13.4)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	0 (0.0)	157 (100.0)	0	2,655	2,812	0.19	0.53
総計 (%)	5,278 (87.1)	564 (9.3)	126 (2.1)	43 (0.7)	26 (0.4)	24 (0.4)	6,061 (100.0)	0	3,008	9,069	0.21	0.77
平均	3.17	3.38	2.58	2.73	1.66	0.83	3.16		1.51	3.07		
標準偏差	3.17	2.85	2.67	2.51	1.97	1.90	3.13		2.36	3.11		

(患者調査による集計)

* 個々の患者の腹膜炎発症率（回/1患者・年）は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

* 患者毎の腹膜炎発症率の平均値が腹膜透析患者全体の腹膜炎発症率を表している訳ではないことにご注意ください。