

補足表 50 年齢と生活活動度，2018

年齢	無症状	軽度症状	50%以上起居	50%以上就床	終日就床	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	6 (11.1)	13 (24.1)	13 (24.1)	6 (11.1)	16 (29.6)	54 (100.0)	9	25	88
15歳～ (%)	439 (70.0)	135 (21.5)	23 (3.7)	12 (1.9)	18 (2.9)	627 (100.0)	22	196	845
30歳～ (%)	6,457 (69.4)	2,194 (23.6)	383 (4.1)	165 (1.8)	105 (1.1)	9,304 (100.0)	360	2,481	12,145
45歳～ (%)	27,771 (61.4)	12,493 (27.6)	2,769 (6.1)	1,312 (2.9)	864 (1.9)	45,209 (100.0)	1,554	11,933	58,696
60歳～ (%)	47,109 (43.7)	36,296 (33.7)	12,668 (11.8)	6,850 (6.4)	4,872 (4.5)	107,795 (100.0)	3,485	28,555	139,835
75歳～ (%)	19,509 (23.5)	25,822 (31.1)	18,055 (21.8)	11,265 (13.6)	8,248 (9.9)	82,899 (100.0)	2,859	22,470	108,228
90歳～ (%)	531 (9.3)	904 (15.8)	1,606 (28.1)	1,428 (25.0)	1,252 (21.9)	5,721 (100.0)	207	1,571	7,499
合計 (%)	101,822 (40.5)	77,857 (30.9)	35,517 (14.1)	21,038 (8.4)	15,375 (6.1)	251,609 (100.0)	8,496	67,231	327,336
不明 (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
記載なし (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計 (%)	101,822 (40.5)	77,857 (30.9)	35,517 (14.1)	21,038 (8.4)	15,375 (6.1)	251,609 (100.0)	8,496	67,231	327,336
平均	63.86	69.00	74.54	75.97	76.43	68.74	68.58	68.83	68.75
標準偏差	12.19	11.41	10.72	10.56	10.77	12.47	13.05	12.54	12.50

(患者調査による集計)

補足表 51 生活活動度と年齢, 1998, 2009, 2018

a) 1998年 透析患者全体

	60歳未満	60～74歳	75歳以上	合計	不明	記載なし	総計
無症状 (%)	37,359 (59.4)	19,017 (36.3)	2,741 (15.9)	59,117 (44.6)	0	54	59,171
軽度症状 (%)	19,465 (31.0)	20,058 (38.3)	5,300 (30.8)	44,823 (33.8)	0	32	44,855
50%以上起居 (%)	3,680 (5.9)	7,324 (14.0)	4,491 (26.1)	15,495 (11.7)	0	15	15,510
50%以上就床 (%)	1,516 (2.4)	3,551 (6.8)	2,730 (15.9)	7,797 (5.9)	0	9	7,806
終日就床 (%)	832 (1.3)	2,420 (4.6)	1,937 (11.3)	5,189 (3.9)	0	16	5,205
合計 (%)	62,852 (100.0)	52,370 (100.0)	17,199 (100.0)	132,421 (100.0)	0	126	132,547
不明, 分類不能	0	0	0	0	0	0	0
記載なし	22,035	19,235	7,332	48,602	0	333	48,935
総計	84,887	71,605	24,531	181,023	0	459	181,482

(患者調査による集計)

b) 2009年 施設血液透析患者 透析回数週3回

	60歳未満	60～74歳	75歳以上	合計	不明	記載なし	総計
無症状 (%)	34,043 (63.3)	41,079 (46.0)	13,044 (24.8)	88,166 (45.0)	0	0	88,166
軽度症状 (%)	14,505 (27.0)	28,474 (31.9)	14,562 (27.6)	57,541 (29.4)	0	1	57,542
50%以上起居 (%)	2,915 (5.4)	10,419 (11.7)	12,069 (22.9)	25,403 (13.0)	0	0	25,403
50%以上就床 (%)	1,375 (2.6)	5,287 (5.9)	7,083 (13.4)	13,745 (7.0)	0	1	13,746
終日就床 (%)	902 (1.7)	4,135 (4.6)	5,932 (11.3)	10,969 (5.6)	0	0	10,969
合計 (%)	53,740 (100.0)	89,394 (100.0)	52,690 (100.0)	195,824 (100.0)	0	2	195,826
不明, 分類不能	542	999	541	2,082	0	0	2,082
記載なし	7,023	11,342	6,298	24,663	0	0	24,663
総計	61,305	101,735	59,529	222,569	0	2	222,571

(患者調査による集計)

c) 2018年 透析患者全体

	60歳未満	60～74歳	75歳以上	合計	不明	記載なし	総計
無症状 (%)	34,673 (62.8)	47,109 (43.7)	20,040 (22.6)	101,822 (40.5)	0	0	101,822
軽度症状 (%)	14,835 (26.9)	36,296 (33.7)	26,726 (30.2)	77,857 (30.9)	0	0	77,857
50%以上起居 (%)	3,188 (5.8)	12,668 (11.8)	19,661 (22.2)	35,517 (14.1)	0	0	35,517
50%以上就床 (%)	1,495 (2.7)	6,850 (6.4)	12,693 (14.3)	21,038 (8.4)	0	0	21,038
終日就床 (%)	1,003 (1.8)	4,872 (4.5)	9,500 (10.7)	15,375 (6.1)	0	0	15,375
合計 (%)	55,194 (100.0)	107,795 (100.0)	88,620 (100.0)	251,609 (100.0)	0	0	251,609
不明, 分類不能	1,945	3,485	3,066	8,496	0	0	8,496
記載なし	14,635	28,555	24,041	67,231	0	0	67,231
総計	71,774	139,835	115,727	327,336	0	0	327,336

(患者調査による集計)