

補足表 59 悪性腫瘍の有無が有りの患者 年末時点での悪性腫瘍の種類と透析歴，2021

透析歴	年末時点での悪性腫瘍の種類（1人につき3つまで回答可）											悪性腫瘍の種類に回答がある患者数	悪性腫瘍の種類に回答がない患者数	合計
	中枢神経系	頭頸部系	呼吸器系	消化器系	肝胆膵系	乳腺・内分泌系	女性器系	腎泌尿器系	血液系	その他	不明			
2年未満 *1 (%)	12 (0.4)	45 (1.4)	412 (13.2)	945 (30.2)	328 (10.5)	210 (6.7)	64 (2.0)	1,201 (38.4)	249 (8.0)	97 (3.1)	5 (0.2)	3,130	292	3,422
2年～ (%)	16 (0.5)	48 (1.4)	525 (15.4)	1,004 (29.5)	381 (11.2)	236 (6.9)	62 (1.8)	1,217 (35.8)	223 (6.6)	112 (3.3)	6 (0.2)	3,404	322	3,726
5年～ (%)	9 (0.3)	59 (1.9)	438 (14.2)	921 (29.9)	298 (9.7)	256 (8.3)	85 (2.8)	1,104 (35.8)	186 (6.0)	105 (3.4)	5 (0.2)	3,083	280	3,363
10年～ (%)	7 (0.5)	42 (2.8)	194 (12.7)	427 (28.0)	126 (8.3)	158 (10.4)	48 (3.1)	560 (36.7)	65 (4.3)	68 (4.5)	7 (0.5)	1,526	134	1,660
15年～ (%)	3 (0.4)	9 (1.1)	95 (12.0)	181 (22.9)	74 (9.4)	97 (12.3)	34 (4.3)	342 (43.3)	39 (4.9)	32 (4.1)	1 (0.1)	790	83	873
20年～ (%)	4 (0.8)	7 (1.5)	48 (10.1)	91 (19.2)	26 (5.5)	85 (17.9)	19 (4.0)	190 (40.1)	21 (4.4)	29 (6.1)	0 (0.0)	474	41	515
25年～ (%)	1 (0.3)	3 (1.0)	34 (11.6)	56 (19.0)	16 (5.4)	53 (18.0)	11 (3.7)	125 (42.5)	16 (5.4)	9 (3.1)	1 (0.3)	294	18	312
30年～ (%)	0 (0.0)	4 (1.9)	24 (11.5)	30 (14.4)	9 (4.3)	41 (19.7)	12 (5.8)	92 (44.2)	12 (5.8)	11 (5.3)	1 (0.5)	208	16	224
35年～ (%)	3 (3.2)	1 (1.1)	10 (10.8)	6 (6.5)	5 (5.4)	24 (25.8)	3 (3.2)	42 (45.2)	4 (4.3)	3 (3.2)	1 (1.1)	93	7	100
40年～ (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (17.3)	7 (13.5)	7 (13.5)	15 (28.8)	3 (5.8)	15 (28.8)	1 (1.9)	1 (1.9)	0 (0.0)	52	5	57
*2 延べ合計 (%)	55 (0.4)	218 (1.5)	1,789 (12.2)	3,668 (25.0)	1,270 (8.6)	1,175 (8.0)	341 (2.3)	4,888 (33.3)	816 (5.6)	467 (3.2)	27 (3.3)	13,054	1,198	14,252
不明 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3	0	3
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
*2 延べ総計 (%)	55 (0.4)	218 (1.5)	1,789 (12.2)	3,670 (25.0)	1,271 (8.7)	1,176 (8.0)	341 (2.3)	4,889 (33.3)	816 (5.6)	467 (3.2)	27 (3.3)	13,057	1,198	14,255
平均	8.64	7.37	6.72	6.12	6.11	10.30	9.54	7.46	5.98	8.16	9.04	0	6.91	7.16
標準偏差	10.25	7.05	7.54	6.59	7.01	10.03	9.20	8.17	7.22	8.15	9.56	0	7.56	7.87

(患者調査による集計)

- *1 数値下の()内%は、すべての有効回答に対する集計用分類が選択された回答割合です。悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、割合の合計は100%とは限りません。
*2 悪性腫瘍の有無は1人につき3つまで回答としたため、合計数は回答の延べ合計、総計数は回答の延べ総計です。回答患者数ではないことにご注意ください。
同一患者が同じ分類の異なる癌腫を複数選択された場合にも、延べ合計（複数カウント）で表示されています。

補足表 60 ドナーとしての腎提供の既往と性別，2021

性別	提供なし	提供あり	合計	不明	記載なし	総計
男性 (%)	157,041 (100.0)	60 (0.0)	157,101 (100.0)	1,761	64,068	222,930
女性 (%)	79,237 (99.9)	55 (0.1)	79,292 (100.0)	840	33,120	113,252
合計 (%)	236,278 (100.0)	115 (0.0)	236,393 (100.0)	2,601	97,188	336,182
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0
総計 (%)	236,278 (100.0)	115 (0.0)	236,393 (100.0)	2,601	97,188	336,182

(患者調査による集計)

補足表 61 ドナーとしての腎提供の既往がりの患者 腎提供から透析導入までの期間*1と原疾患, 2021

原疾患	60ヵ月未満 (5年未満)	60ヵ月～ (5年～)	120ヵ月～ (10年～)	180ヵ月～ (15年～)	240ヵ月～ (20年～)	300ヵ月～ (25年～)	360ヵ月～ (30年～)	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
糖尿病性腎症 (%)	1 (4.8)	1 (4.8)	2 (9.5)	4 (19.0)	6 (28.6)	3 (14.3)	4 (19.0)	21 (100.0)	1	1	23	260.81	113.80
慢性糸球体腎炎 (%)	0 (0.0)	2 (7.7)	7 (26.9)	5 (19.2)	6 (23.1)	3 (11.5)	3 (11.5)	26 (100.0)	2	0	28	237.92	99.19
腎硬化症 (%)	0 (0.0)	4 (20.0)	4 (20.0)	2 (10.0)	4 (20.0)	4 (20.0)	2 (10.0)	20 (100.0)	2	1	23	233.20	108.12
上記以外の原疾患 (%)	2 (9.5)	3 (14.3)	3 (14.3)	6 (28.6)	2 (9.5)	1 (4.8)	4 (19.0)	21 (100.0)	1	1	23	225.38	141.25
不明 (%)	1 (5.9)	2 (11.8)	2 (11.8)	2 (11.8)	2 (11.8)	3 (17.6)	5 (29.4)	17 (100.0)	1	0	18	264.06	137.32
合計 (%)	4 (3.8)	12 (11.4)	18 (17.1)	19 (18.1)	20 (19.0)	14 (13.3)	18 (17.1)	105 (100.0)	7	3	115	243.32	118.12
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0	0
総計 (%)	4 (3.8)	12 (11.4)	18 (17.1)	19 (18.1)	20 (19.0)	14 (13.3)	18 (17.1)	105 (100.0)	7	3	115	243.32	118.12

*1 腎提供月が99もしくは空欄であるデータは60件であったが、腎提供月をその年の6月として集計した。

(患者調査による集計)

補足表 62 ドナーとしての腎提供の既往がりの患者 腎提供から透析導入までの期間(月)*1 腎提供時の年齢*2*3, 2021

腎提供時の 年齢	60ヵ月未満 (5年未満)	60ヵ月～ (5年～)	120ヵ月～ (10年～)	180ヵ月～ (15年～)	240ヵ月～ (20年～)	300ヵ月～ (25年～)	360ヵ月～ (30年～)	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
20歳未満 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0	0
20歳～ (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (22.2)	1 (5.6)	4 (22.2)	4 (22.2)	5 (27.8)	18 (100.0)	0	0	18	327.94	149.59
40歳～ (%)	1 (1.7)	4 (6.9)	10 (17.2)	12 (20.7)	10 (17.2)	9 (15.5)	12 (20.7)	58 (100.0)	0	0	58	255.95	97.00
60歳～ (%)	3 (10.3)	8 (27.6)	4 (13.8)	6 (20.7)	6 (20.7)	1 (3.4)	1 (3.4)	29 (100.0)	0	0	29	165.55	88.81
合計 (%)	4 (3.8)	12 (11.4)	18 (17.1)	19 (18.1)	20 (19.0)	14 (13.3)	18 (17.1)	105 (100.0)	0	0	105	243.32	118.12
不明 (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7	0	7	0	0
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	3	3	0	0
総計 (%)	4 (3.8)	12 (11.4)	18 (17.1)	19 (18.1)	20 (19.0)	14 (13.3)	18 (17.1)	105 (100.0)	7	3	115	243.32	118.12
平均	63.50	61.58	51.78	54.84	50.15	45.79	44.67	51.57	0	0	51.57	0	0
標準偏差	11.82	11.42	13.55	11.02	12.46	10.95	11.03	12.82	0	0	12.82	0	0

*1 腎提供月が99もしくは空欄であるデータは60件であったが、腎提供月をその年の6月として集計した。

(患者調査による集計)

*2 腎提供時の年齢は腎提供年の年末時点での年齢で集計した。

*3 腎提供年が記載なしの場合、腎提供時の年齢は記載なし。生年が記載なしもしくは不明で腎提供年が不明の場合は不明で集計した。