

補足表 47 腹膜透析患者 年齢と性別, 2022

性別	40歳未満	40歳～	65歳～	75歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	280 (4.2)	2,714 (41.2)	1,937 (29.4)	1,659 (25.2)	6,590 (100.0)	0	0	6,590	64.68	14.21
女性 (%)	188 (5.5)	1,391 (40.4)	906 (26.3)	959 (27.8)	3,444 (100.0)	0	0	3,444	64.62	15.97
合計 (%)	468 (4.7)	4,105 (40.9)	2,843 (28.3)	2,618 (26.1)	10,034 (100.0)	0	0	10,034	64.66	14.84
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0	0
総計 (%)	468 (4.7)	4,105 (40.9)	2,843 (28.3)	2,618 (26.1)	10,034 (100.0)	0	0	10,034	64.66	14.84

(患者調査による集計)

補足表 48 腹膜透析単独患者 年齢と性別, 2022

性別	40歳未満	40歳～	65歳～	75歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	226 (4.4)	1,959 (37.8)	1,539 (29.7)	1,455 (28.1)	5,179 (100.0)	0	0	5,179	65.53	14.66
女性 (%)	175 (6.1)	1,079 (37.3)	774 (26.8)	864 (29.9)	2,892 (100.0)	0	0	2,892	65.06	16.56
合計 (%)	401 (5.0)	3,038 (37.6)	2,313 (28.7)	2,319 (28.7)	8,071 (100.0)	0	0	8,071	65.36	15.37
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0	0
総計 (%)	401 (5.0)	3,038 (37.6)	2,313 (28.7)	2,319 (28.7)	8,071 (100.0)	0	0	8,071	65.36	15.37

(患者調査による集計)

補足表 49 腹膜透析と血液透析併用患者 年齢と性別, 2022

性別	40歳未満	40歳～	65歳～	75歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	54 (3.8)	755 (53.5)	398 (28.2)	204 (14.5)	1,411 (100.0)	0	0	1,411	61.58	11.93
女性 (%)	13 (2.4)	312 (56.5)	132 (23.9)	95 (17.2)	552 (100.0)	0	0	552	62.31	12.17
合計 (%)	67 (3.4)	1,067 (54.4)	530 (27.0)	299 (15.2)	1,963 (100.0)	0	0	1,963	61.78	12.00
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0	0
総計 (%)	67 (3.4)	1,067 (54.4)	530 (27.0)	299 (15.2)	1,963 (100.0)	0	0	1,963	61.78	12.00

(患者調査による集計)

補足表 50 腹膜透析患者 現在施行中のPD歴（月）と性別，2022

性別	24ヵ月未満 (2年未満)	24ヵ月～ (2年～)	48ヵ月～ (4年～)	72ヵ月～ (6年～)	96ヵ月～ (8年～)	120ヵ月～ (10年～)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	1,976 (43.9)	1,315 (29.2)	656 (14.6)	283 (6.3)	121 (2.7)	146 (3.2)	4,497 (100.0)	2,093	6,590	36.84	34.93
女性 (%)	989 (41.2)	668 (27.8)	366 (15.2)	185 (7.7)	70 (2.9)	123 (5.1)	2,401 (100.0)	1,043	3,444	40.75	39.91
合計 (%)	2,965 (43.0)	1,983 (28.7)	1,022 (14.8)	468 (6.8)	191 (2.8)	269 (3.9)	6,898 (100.0)	3,136	10,034	38.20	36.79
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0
総計 (%)	2,965 (43.0)	1,983 (28.7)	1,022 (14.8)	468 (6.8)	191 (2.8)	269 (3.9)	6,898 (100.0)	3,136	10,034	38.20	36.79

(患者調査による集計)

補足表 51 腹膜透析単独患者 現在施行中のPD歴（月）と性別，2022

性別	24ヵ月未満 (2年未満)	24ヵ月～ (2年～)	48ヵ月～ (4年～)	72ヵ月～ (6年～)	96ヵ月～ (8年～)	120ヵ月～ (10年～)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	1,815 (51.7)	1,031 (29.3)	428 (12.2)	152 (4.3)	50 (1.4)	38 (1.1)	3,514 (100.0)	1,665	5,179	29.36	25.88
女性 (%)	947 (47.0)	571 (28.3)	285 (14.1)	124 (6.2)	35 (1.7)	53 (2.6)	2,015 (100.0)	877	2,892	34.16	32.78
合計 (%)	2,762 (50.0)	1,602 (29.0)	713 (12.9)	276 (5.0)	85 (1.5)	91 (1.6)	5,529 (100.0)	2,542	8,071	31.11	28.68
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0
総計 (%)	2,762 (50.0)	1,602 (29.0)	713 (12.9)	276 (5.0)	85 (1.5)	91 (1.6)	5,529 (100.0)	2,542	8,071	31.11	28.68

(患者調査による集計)

補足表 52 腹膜透析と血液透析併用患者 現在施行中のPD歴（月）と性別，2022

性別	24ヵ月未満 (2年未満)	24ヵ月～ (2年～)	48ヵ月～ (4年～)	72ヵ月～ (6年～)	96ヵ月～ (8年～)	120ヵ月～ (10年～)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	161 (16.4)	284 (28.9)	228 (23.2)	131 (13.3)	71 (7.2)	108 (11.0)	983 (100.0)	428	1,411	63.60	47.69
女性 (%)	42 (10.9)	97 (25.1)	81 (21.0)	61 (15.8)	35 (9.1)	70 (18.1)	386 (100.0)	166	552	75.18	53.80
合計 (%)	203 (14.8)	381 (27.8)	309 (22.6)	192 (14.0)	106 (7.7)	178 (13.0)	1,369 (100.0)	594	1,963	66.86	49.74
記載なし (%)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0	0	0	0
総計 (%)	203 (14.8)	381 (27.8)	309 (22.6)	192 (14.0)	106 (7.7)	178 (13.0)	1,369 (100.0)	594	1,963	66.86	49.74

(患者調査による集計)