

# 1) 血清各脂質値

(5) 原疾患別各脂質平均値 (図表25)

原疾患	血清総コレステロール (mg/dl)		血清中性脂肪 (mg/dl)		血清HDLコレステロール (mg/dl)		血清LDLコレステロール (mg/dl)	
	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	平均値	標準偏差
慢性糸球体腎炎	160.12	37.22	111.20	70.43	48.05	18.35	90.29	30.53
慢性腎盂腎炎	162.12	37.80	109.24	66.37	49.79	19.36	91.13	30.67
急速進行性糸球体腎炎	169.12	44.31	113.53	68.51	50.53	19.68	96.77	34.60
妊娠腎/妊娠中毒症	171.99	36.99	117.49	68.54	51.26	17.78	97.31	30.72
その他分類不能の腎炎	159.24	36.77	110.15	70.29	48.60	19.11	89.04	30.64
多発性嚢胞腎	158.38	34.68	107.09	62.53	47.24	17.34	90.37	28.34
腎硬化症	160.56	36.42	108.05	68.85	45.98	16.34	92.87	29.91
悪性高血圧	162.37	36.41	121.69	79.92	48.13	19.74	91.29	30.60
糖尿病性腎症	157.60	39.08	120.83	75.37	42.99	18.07	90.93	31.69
SLE腎炎	171.02	39.71	118.31	65.89	52.32	18.05	95.47	31.66
アミロイド腎	168.12	44.95	110.04	60.44	50.97	15.92	95.74	37.79
痛風腎	152.16	33.51	113.58	74.02	45.95	17.94	84.20	26.69
先天性代謝異常による腎不全	154.50	41.40	118.58	96.73	48.15	17.86	81.18	29.23
腎・尿路結核	156.90	38.55	98.87	57.01	49.83	17.15	87.67	30.11
腎・尿路結石	159.51	37.46	108.84	70.53	48.43	18.33	88.72	31.58
腎・尿路腫瘍	156.23	37.48	105.28	60.71	45.97	15.55	90.19	29.65
閉塞性尿路障害	161.69	38.02	110.82	74.47	48.55	18.53	92.19	30.34
骨髄腫	165.66	44.49	121.19	78.93	45.98	14.51	93.60	38.81
腎形成不全	159.80	44.21	110.93	75.71	52.54	19.57	86.32	32.79
移植後再導入	158.55	36.49	120.96	73.27	47.28	17.89	87.77	29.42
その他	160.75	40.44	112.55	71.36	48.73	21.17	91.74	33.28
不明	160.11	37.88	110.46	69.25	47.82	22.10	91.36	30.33
合計	159.59	37.89	113.87	71.66	46.56	18.59	90.79	30.86
記載なし	160.25	39.43	112.22	68.00	44.25	16.03	96.64	33.61
総計	159.60	37.90	113.87	71.66	46.56	18.59	90.80	30.86

## 解説

原疾患と各脂質値を検討しました。慢性糸球体腎炎と糖尿病性腎症の比較では、血清総コレステロールは糖尿病性腎症でやや低値ですが、血清中性脂肪は慢性糸球体腎炎111.20mg/dlに対し糖尿病性腎症120.83mg/dlと高値を示しました。血清HDLコレステロールは糖尿病性腎症で42.99mg/dlと全原疾患の中で最も低値を示し、糖尿病に伴う脂質代謝異常が示唆されました。血清LDLコレステロールには明らかな差を認めませんでした。