


2) ビタミンD製剤の使用状況

(3) 透析歴別 経口ビタミンD製剤の使用頻度 (図表31)



| | 2年未満 | 2年~ | 5年~ | 10年~ | 15年~ | 20年~ | 25年~ |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| アルファカルシドール | 13,835 | 15,151 | 12,492 | 5,430 | 2,705 | 1,746 | 1,521 |
| (%) | (31.7) | (31.5) | (27.5) | (25.0) | (23.9) | (24.5) | (27.8) |
| カルシトリオール | 4,377 | 4,564 | 4,041 | 1,927 | 1,136 | 768 | 612 |
| (%) | (10.0) | (9.5) | (8.9) | (8.9) | (10.0) | (10.8) | (11.2) |
| ファレカルシトリオール | 831 | 1,159 | 1,231 | 705 | 348 | 224 | 158 |
| (%) | (1.9) | (2.4) | (2.7) | (3.2) | (3.1) | (3.1) | (2.9) |
| その他 | 353 | 353 | 264 | 90 | 37 | 27 | 23 |
| (%) | (0.8) | (0.7) | (0.6) | (0.4) | (0.3) | (0.4) | (0.4) |
| 使用していない | 23,968 | 26,660 | 27,136 | 13,436 | 7,017 | 4,324 | 3,132 |
| (%) | (54.9) | (55.4) | (59.7) | (61.9) | (62.0) | (60.7) | (57.2) |
| 不明 | 311 | 235 | 263 | 106 | 82 | 35 | 31 |
| (%) | (0.7) | (0.5) | (0.6) | (0.5) | (0.7) | (0.5) | (0.6) |

数値は行方向の合計に対する%です。

解説

透析歴と経口ビタミンD製剤使用頻度の関連について検討しました。
透析歴とともに経口ビタミンD製剤使用頻度は低下しており、透析歴20年以降に再び増加傾向を認めました。