


3) 導入患者の現状

(1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満	9 (0.0)	4 (0.0)	13 (0.0)		13 (0.0)
5歳～	7 (0.0)	5 (0.0)	12 (0.0)		12 (0.0)
10歳～	8 (0.0)	3 (0.0)	11 (0.0)		11 (0.0)
15歳～	33 (0.1)	19 (0.2)	52 (0.1)		52 (0.1)
20歳～	60 (0.3)	27 (0.2)	87 (0.2)		87 (0.2)
25歳～	111 (0.5)	75 (0.6)	186 (0.5)	1 (5.3)	187 (0.5)
30歳～	277 (1.2)	148 (1.2)	425 (1.2)	1 (5.3)	426 (1.2)
35歳～	467 (2.1)	227 (1.8)	694 (2.0)		694 (2.0)
40歳～	637 (2.8)	318 (2.5)	955 (2.7)		955 (2.7)
45歳～	928 (4.1)	415 (3.3)	1,343 (3.9)		1,343 (3.9)
50歳～	1,521 (6.8)	745 (6.0)	2,266 (6.5)		2,266 (6.5)
55歳～	2,698 (12.1)	1,184 (9.5)	3,882 (11.1)	2 (10.5)	3,884 (11.1)
60歳～	2,734 (12.2)	1,305 (10.5)	4,039 (11.6)	3 (15.8)	4,042 (11.6)
65歳～	3,168 (14.2)	1,609 (12.9)	4,777 (13.7)	3 (15.8)	4,780 (13.7)
70歳～	3,650 (16.3)	1,855 (14.9)	5,505 (15.8)	3 (15.8)	5,508 (15.8)
75歳～	3,110 (13.9)	1,956 (15.7)	5,066 (14.5)	2 (10.5)	5,068 (14.5)
80歳～	2,007 (9.0)	1,579 (12.7)	3,586 (10.3)	2 (10.5)	3,588 (10.3)
85歳～	745 (3.3)	767 (6.1)	1,512 (4.3)	2 (10.5)	1,514 (4.3)
90歳～	195 (0.9)	209 (1.7)	404 (1.2)		404 (1.2)
95歳～	23 (0.1)	26 (0.2)	49 (0.1)		49 (0.1)
合計	22,388 (100.0)	12,476 (100.0)	34,864 (100.0)	19 (100.0)	34,883 (100.0)
記載なし	196	104	300	9	309
総計	22,584	12,580	35,164	28	35,192
平均	65.59	67.84	66.40	66.58	66.40
標準偏差	13.15	13.73	13.40	15.26	13.40

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

解説

導入患者の年齢と性別

2006年に導入された患者数は36,373人であった。この中で年齢と性別の記載された合計は34,864人であり、このうち男性は22,388人で、女性が12,476人であった。5歳毎で検討すると表に示すように男性では55歳以降、女性では60歳以降の群で、導入される割合が10%を超えた。最大値は男性で70～75歳、女性で75歳～80歳であった。このような分布を反映して、導入時平均年齢は男性で65.6歳、女性で67.8歳であった。2005年と比較して、男性で0.2歳、女性で0.2歳上昇した。