


### 3) 導入患者の現状

(1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満	8 (0.0)	10 (0.1)	18 (0.0)		18 (0.0)
5歳～	6 (0.0)	4 (0.0)	10 (0.0)		10 (0.0)
10歳～	12 (0.1)	6 (0.0)	18 (0.0)		18 (0.0)
15歳～	22 (0.1)	12 (0.1)	34 (0.1)		34 (0.1)
20歳～	75 (0.3)	36 (0.3)	111 (0.3)		111 (0.3)
25歳～	122 (0.5)	68 (0.5)	190 (0.5)	1 (2.1)	191 (0.5)
30歳～	249 (1.1)	120 (0.9)	369 (1.0)		369 (1.0)
35歳～	475 (2.0)	218 (1.7)	693 (1.9)	2 (4.2)	695 (1.9)
40歳～	676 (2.9)	256 (2.0)	932 (2.6)	1 (2.1)	933 (2.6)
45歳～	1,003 (4.3)	429 (3.4)	1,432 (3.9)	1 (2.1)	1,433 (3.9)
50歳～	1,467 (6.2)	625 (4.9)	2,092 (5.8)	2 (4.2)	2,094 (5.8)
55歳～	2,822 (12.0)	1,196 (9.4)	4,018 (11.1)	9 (18.8)	4,027 (11.1)
60歳～	2,866 (12.2)	1,281 (10.0)	4,147 (11.4)	6 (12.5)	4,153 (11.4)
65歳～	3,311 (14.1)	1,648 (12.9)	4,959 (13.7)	10 (20.8)	4,969 (13.7)
70歳～	3,779 (16.1)	1,953 (15.3)	5,732 (15.8)	7 (14.6)	5,739 (15.8)
75歳～	3,392 (14.4)	2,075 (16.3)	5,467 (15.1)	5 (10.4)	5,472 (15.1)
80歳～	2,228 (9.5)	1,682 (13.2)	3,910 (10.8)	2 (4.2)	3,912 (10.8)
85歳～	834 (3.5)	895 (7.0)	1,729 (4.8)	2 (4.2)	1,731 (4.8)
90歳～	155 (0.7)	216 (1.7)	371 (1.0)		371 (1.0)
95歳～	26 (0.1)	25 (0.2)	51 (0.1)		51 (0.1)
合計	23,528 (100.0)	12,755 (100.0)	36,283 (100.0)	48 (100.0)	36,331 (100.0)
記載なし	67	37	104	2	106
総計	23,595	12,792	36,387	50	36,437
平均	65.81	68.57	66.78	64.19	66.78
標準偏差	13.09	13.57	13.33	12.34	13.33

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

患者調査による集計

#### 解説

#### 導入患者の年齢と性別

2007年に導入された患者は36,909人であったが、シートⅡ以降に記載された数は36,437人、年齢と性別の記載された合計は36,283人であり、このうち男性は23,528人で、女性は12,755人であった。男女比率は前年度と同様に男性が圧倒的に多い。年齢で検討すると、男女ともに55歳以降で患者数が急増する傾向が認められた。最大値は男性では70～75歳で16.1%、女性で75～80歳で16.3%であった。最大値年齢は前年度と同じであり、このような導入年齢分布を反映して、導入時平均年齢は男性で65.8歳、女性で68.6歳であった。平均年齢は2006年と比較して、男性で0.2歳、女性で0.8歳増加した。全体の平均年齢は66.8歳で、2006年と比較し0.4歳増加した。