


### 3) 導入患者の現状

#### (1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満	8 (0.0)	8 (0.1)	16 (0.0)		16 (0.0)
5歳~	3 (0.0)	3 (0.0)	6 (0.0)		6 (0.0)
10歳~	7 (0.0)	3 (0.0)	10 (0.0)		10 (0.0)
15歳~	25 (0.1)	17 (0.1)	42 (0.1)		42 (0.1)
20歳~	68 (0.3)	29 (0.2)	97 (0.3)		97 (0.3)
25歳~	101 (0.4)	70 (0.5)	171 (0.5)		171 (0.5)
30歳~	250 (1.0)	128 (1.0)	378 (1.0)		378 (1.0)
35歳~	467 (1.9)	223 (1.7)	690 (1.8)		690 (1.8)
40歳~	667 (2.7)	279 (2.1)	946 (2.5)		946 (2.5)
45歳~	969 (4.0)	421 (3.2)	1,390 (3.7)		1,390 (3.7)
50歳~	1,472 (6.0)	619 (4.8)	2,091 (5.6)	2 (12.5)	2,093 (5.6)
55歳~	2,742 (11.3)	1,124 (8.7)	3,866 (10.4)	2 (12.5)	3,868 (10.4)
60歳~	3,123 (12.8)	1,308 (10.1)	4,431 (11.9)	2 (12.5)	4,433 (11.9)
65歳~	3,443 (14.1)	1,607 (12.4)	5,050 (13.5)	2 (12.5)	5,052 (13.5)
70歳~	3,818 (15.7)	1,980 (15.3)	5,798 (15.5)	3 (18.8)	5,801 (15.5)
75歳~	3,551 (14.6)	2,145 (16.5)	5,696 (15.3)	2 (12.5)	5,698 (15.3)
80歳~	2,450 (10.1)	1,770 (13.6)	4,220 (11.3)		4,220 (11.3)
85歳~	945 (3.9)	976 (7.5)	1,921 (5.1)	1 (6.3)	1,922 (5.1)
90歳~	231 (0.9)	231 (1.8)	462 (1.2)	1 (6.3)	463 (1.2)
95歳~	26 (0.1)	36 (0.3)	62 (0.2)	1 (6.3)	63 (0.2)
合計	24,366 (100.0)	12,977 (100.0)	37,343 (100.0)	16 (100.0)	37,359 (100.0)
記載なし	77	37	114	6	120
総計	24,443	13,014	37,457	22	37,479
平均	66.3	68.92	67.21	69.75	67.21
標準偏差	13.01	13.63	13.29	13.35	13.29

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

患者調査による集計

#### 解説

2008年に導入された患者数は施設調査の合計では37,671人であったが、患者調査表に記載された2008年導入患者数は37,479人、年齢と性別の記載された合計は37,343人であった。このうち男性は24,366人で、女性は12,977人であった。男女比率は前年度と同様に男性が圧倒的に多かった。年齢で検討すると、男女ともに55歳以降で患者数が急増する傾向が認められた。最も割合が高い年齢層は男性では70～75歳で15.7%、女性では75～80歳で16.5%であり、同様の傾向が近年認められている。このような導入年齢分布を反映して、導入時平均年齢は男性が66.3歳で2007年と比較し0.5歳、女性は68.9歳で0.4歳高齢化した。全体の平均年齢は67.2歳で、2007年と比較して0.4歳増加し、導入患者の高齢化の傾向は続いている。