


2) 血液透析条件の現況

(1) 透析条件の実態1 (週透析回数・一回透析時間) (図表26)



週透析回数	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	862 (0.4)	9,025 (4.0)	212,808 (95.3)	481 (0.2)	7 (0.0)	8 (0.0)	1 (0.0)	223,192 (100.0)	20,740	243,932	2.95	0.24
血液濾過透析 (%)	20 (0.1)	198 (1.3)	15,499 (98.2)	63 (0.4)			1 (0.0)	15,781 (100.0)	1,449	17,230	2.99	0.15
合計 (%)	882 (0.4)	9,223 (3.9)	228,307 (95.5)	544 (0.2)	7 (0.0)	8 (0.0)	2 (0.0)	238,973 (100.0)	22,189	261,162	2.96	0.23

一回透析時間	3.0未満	3.0~	3.5~	4.0~	4.5~	5.0~	5.5~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 (%)	588 (0.3)	27,877 (13.1)	19,501 (9.2)	141,069 (66.5)	11,112 (5.2)	10,711 (5.0)	1,349 (0.6)	212,207 (100.0)	601	212,808	3.92	0.53
血液濾過透析 (%)	20 (0.1)	962 (6.2)	830 (5.4)	9,782 (63.4)	1,798 (11.7)	1,836 (11.9)	204 (1.3)	15,432 (100.0)	67	15,499	4.12	0.53
合計 (%)	608 (0.3)	28,839 (12.7)	20,331 (8.9)	150,851 (66.3)	12,910 (5.7)	12,547 (5.5)	1,553 (0.7)	227,639 (100.0)	668	228,307	3.93	0.54

患者調査による集計

解説

施設血液透析患者 (HD患者) の95.3%、血液透析濾過患者 (HDF患者) の98.2%と、ほとんどの患者が週三回の治療を受けていた。週三回のHD患者では、4時間治療 (4時間以上4.5時間未満) が66.5%、4時間未満透析が22.6%、4.5時間以上が10.8%であった。週三回のHDF患者では、4時間治療 (4時間以上4.5時間未満) が63.4%、4時間未満が11.7%、4.5時間以上が24.9%であった。

HD患者とHDF患者を比較すると、HDF患者で4.5時間以上の治療を受けている患者割合が多く、「透析時間」が長い傾向がみられた。平均透析時間は、施設血液透析患者は3.9時間、血液透析濾過患者は4.1時間であった。