


3) 導入患者の現状

(1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満	8 (0.0)	9 (0.1)	17 (0.0)	0	17 (0.0)
5歳～	6 (0.0)	0	6 (0.0)	0	6 (0.0)
10歳～	7 (0.0)	4 (0.0)	11 (0.0)	0	11 (0.0)
15歳～	24 (0.1)	18 (0.1)	42 (0.1)	0	42 (0.1)
20歳～	53 (0.2)	23 (0.2)	76 (0.2)	0	76 (0.2)
25歳～	103 (0.4)	52 (0.4)	155 (0.4)	0	155 (0.4)
30歳～	246 (1.0)	114 (0.9)	360 (1.0)	0	360 (1.0)
35歳～	494 (2.0)	228 (1.8)	722 (2.0)	0	722 (2.0)
40歳～	677 (2.8)	297 (2.3)	974 (2.6)	0	974 (2.6)
45歳～	1,018 (4.2)	410 (3.2)	1,428 (3.9)	0	1,428 (3.9)
50歳～	1,412 (5.8)	600 (4.7)	2,012 (5.4)	0	2,012 (5.4)
55歳～	2,410 (10.0)	1,027 (8.0)	3,437 (9.3)	1 (11.1)	3,438 (9.3)
60歳～	3,232 (13.3)	1,377 (10.8)	4,609 (12.5)	2 (22.2)	4,611 (12.5)
65歳～	3,574 (14.8)	1,622 (12.7)	5,196 (14.0)	3 (33.3)	5,199 (14.1)
70歳～	3,641 (15.0)	1,879 (14.7)	5,520 (14.9)	0	5,520 (14.9)
75歳～	3,618 (14.9)	2,050 (16.0)	5,668 (15.3)	0	5,668 (15.3)
80歳～	2,546 (10.5)	1,763 (13.8)	4,309 (11.6)	1 (11.1)	4,310 (11.6)
85歳～	942 (3.9)	1,012 (7.9)	1,954 (5.3)	1 (11.1)	1,955 (5.3)
90歳～	179 (0.7)	251 (2.0)	430 (1.2)	0	430 (1.2)
95歳～	21 (0.1)	43 (0.3)	64 (0.2)	1 (11.1)	65 (0.2)
合計	24,211 (100.0)	12,779 (100.0)	36,990 (100.0)	9 (100.0)	36,999 (100.0)
記載なし	73	45	118	0	118
総計	24,284	12,824	37,108	9	37,117
平均	66.37	69.07	67.31	71.67	67.31
標準偏差	13.04	13.61	13.3	13.08	13.3

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

患者調査による集計

解説

2009年に導入された患者数は施設調査の合計では37,543人であったが、患者調査表に記載された2009年導入患者数は37,117人、年齢と性別の記載された合計は36,990人であった。このうち男性は24,211人で、女性は12,779人であった。男女比率は前年度と同様に男性が圧倒的に多かった。年齢で検討すると、男女ともに55歳以降で患者数が急増する傾向が認められた。最も割合が高い年齢層は男性で70～75歳で15.0%、女性では75～80歳で16.0%であり、同様の傾向が近年認められている。このような導入年齢分布を反映して、導入時平均年齢は男性が66.4歳で2008年と比較し0.1歳、女性は69.1歳で0.2歳高齢化した。全体の平均年齢は67.3歳で、2008年と比較して0.1歳増加した。ちなみに2006年は66.4歳、2007年は66.8歳、2008年は67.2歳であるので、高齢化の速度は少し緩やかとなった。