


4) 年末患者の現状

(3) 年末患者の主要原疾患の割合推移 (図表14)



| 年 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 糖尿病性腎症 | 7.4 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 12.8 | 14.0 | 14.9 | 16.4 | 17.1 | 18.2 | 19.2 | 20.4 |
| 慢性糸球体腎炎 | 74.5 | 72.1 | 72.3 | 70.6 | 69.4 | 67.9 | 65.9 | 64.1 | 61.7 | 60.4 | 58.8 | 57.7 | 56.6 |
| 腎硬化症 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 |
| 多発性嚢胞腎 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 |
| 慢性腎盂腎炎 | 3.1 | 3.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| SLE腎炎 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 不明 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |

| 年 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 糖尿病性腎症 | 21.6 | 22.7 | 24.0 | 25.1 | 26.0 | 27.2 | 28.1 | 29.2 | 30.2 | 31.4 | 32.3 | 33.4 | 34.2 | 35.1 |
| 慢性糸球体腎炎 | 55.4 | 54.1 | 52.5 | 51.1 | 49.7 | 49.6 | 48.2 | 46.6 | 45.1 | 43.6 | 42.2 | 40.4 | 39.0 | 37.6 |
| 腎硬化症 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.1 |
| 多発性嚢胞腎 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| 慢性腎盂腎炎 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| SLE腎炎 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 不明 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 7.0 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |

患者調査による集計

解説

経年的な年末患者の主要原疾患の推移をみると、慢性糸球体腎炎の減少傾向は明らかで2009年末では37.6%と前年より1.4%減少した。一方、糖尿病性腎症は上昇し、2009年末には35.1%と前年より0.9%増加した。1998年に糖尿病性腎症が導入原疾患の第一位となってから糖尿病性腎症患者の割合は増加の一途である。第三位は原疾患不明で7.8%、第四位は腎硬化症で7.1%であった。その他、多発性嚢胞腎、慢性腎盂腎炎、SLE腎炎、急速進行性糸球体腎炎などの割合はほぼ例年通りの数値で推移している。