


5) 死亡原因

(3) 2009年死亡患者の死亡原因分類 (図表18)



| 死因 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 | 死因 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 心不全 | 3,570 | 2,403 | 5,973 | 1 | 5,974 | 脳症 | 22 | 8 | 30 | 0 | 30 |
| (%) | (22.3) | (26.7) | (23.9) | (33.3) | (23.9) | (%) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) |
| 脳血管障害 | 1,307 | 793 | 2,100 | 0 | 2,100 | 自殺/拒否 | 170 | 68 | 238 | 0 | 238 |
| (%) | (8.1) | (8.8) | (8.4) | | (8.4) | (%) | (1.1) | (0.8) | (1.0) | | (1.0) |
| 感染症 | 3,395 | 1,819 | 5,214 | 1 | 5,215 | 腸閉塞 | 135 | 99 | 234 | 0 | 234 |
| (%) | (21.2) | (20.2) | (20.8) | (33.3) | (20.8) | (%) | (0.8) | (1.1) | (0.9) | | (0.9) |
| 出血 | 295 | 190 | 485 | 0 | 485 | 肺血栓/肺栓塞 | 43 | 21 | 64 | 0 | 64 |
| (%) | (1.8) | (2.1) | (1.9) | | (1.9) | (%) | (0.3) | (0.2) | (0.3) | | (0.3) |
| 悪性腫瘍 | 1,713 | 643 | 2,356 | 0 | 2,356 | 災害死 | 117 | 39 | 156 | 0 | 156 |
| (%) | (10.7) | (7.1) | (9.4) | | (9.4) | (%) | (0.7) | (0.4) | (0.6) | | (0.6) |
| 悪液質/尿毒症 | 425 | 260 | 685 | 0 | 685 | その他 | 1,473 | 1,012 | 2,485 | 1 | 2,486 |
| (%) | (2.6) | (2.9) | (2.7) | | (2.7) | (%) | (9.2) | (11.2) | (9.9) | (33.3) | (9.9) |
| 心筋梗塞 | 708 | 320 | 1,028 | 0 | 1,028 | 不明 | 1,691 | 843 | 2,534 | 0 | 2,534 |
| (%) | (4.4) | (3.6) | (4.1) | | (4.1) | (%) | (10.5) | (9.4) | (10.1) | | (10.1) |
| カリウム中毒/頓死 | 758 | 407 | 1,165 | 0 | 1,165 | 合計 | 16,038 | 9,006 | 25,044 | 3 | 25,047 |
| (%) | (4.7) | (4.5) | (4.7) | | (4.7) | (%) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) |
| 慢性肝炎/肝硬変症 | 216 | 81 | 297 | 0 | 297 | 記載なし | 103 | 73 | 176 | 1 | 177 |
| (%) | (1.3) | (0.9) | (1.2) | | (1.2) | 総計 | 16,141 | 9,079 | 25,220 | 4 | 25,224 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

患者調査による集計

解説

年間の死亡者数は透析患者の増加とともに経年的に増加している。2009年では27,729人が死亡し、2008年と比べ828人増加した。患者調査表に死亡原因と性別が記載された25,044人で検討すると、男性では心不全(22.3%)、感染症(21.2%)、悪性腫瘍(10.7%)、不明(10.5%)、その他(9.2%)の順であった。女性では心不全(26.7%)、感染症(20.2%)、その他(11.2%)、不明(9.4%)、脳血管障害(8.8%)の順であった。全体では心不全(23.9%)、感染症(20.8%)、不明(10.1%)、その他(9.9%)、悪性腫瘍(9.4%)の順であった。心不全、脳血管障害、心筋梗塞という心血管障害で死亡する割合は女性で39.1%、男性で34.8%であり、死亡原因の割合では女性が多い。