

## 6) 年間粗死亡率と生存率

### (2) 導入後1年・5年・10年・15年・20年・25年生存率の推移 (図表21)



導入年	人数	1年生存率	2年生存率	3年生存率	4年生存率	5年生存率	6年生存率	7年生存率	8年生存率	9年生存率	10年生存率	11年生存率	12年生存率	13年生存率	14年生存率	15年生存率	16年生存率	17年生存率	18年生存率	19年生存率	20年生存率	21年生存率	22年生存率	23年生存率	24年生存率	25年生存率	26年生存率
1983	9,886	0.819	0.747	0.682	0.633	0.589	0.556	0.523	0.485	0.456	0.425	0.395	0.372	0.348	0.329	0.307	0.288	0.272	0.255	0.241	0.226	0.213	0.199	0.189	0.179	0.166	0.156
1984	10,713	0.817	0.735	0.671	0.620	0.577	0.538	0.498	0.465	0.435	0.407	0.378	0.353	0.329	0.308	0.288	0.271	0.253	0.239	0.226	0.212	0.198	0.188	0.179	0.167	0.158	
1985	11,626	0.795	0.720	0.660	0.609	0.563	0.520	0.485	0.444	0.413	0.385	0.361	0.336	0.311	0.289	0.271	0.253	0.236	0.221	0.208	0.192	0.179	0.168	0.156	0.147		
1986	12,631	0.799	0.725	0.667	0.619	0.566	0.521	0.480	0.445	0.408	0.379	0.352	0.328	0.305	0.284	0.267	0.250	0.234	0.221	0.209	0.196	0.183	0.173	0.162			
1987	13,563	0.815	0.738	0.671	0.607	0.556	0.507	0.462	0.426	0.393	0.364	0.338	0.314	0.293	0.271	0.253	0.238	0.220	0.203	0.190	0.180	0.170	0.159				
1988	14,771	0.825	0.741	0.667	0.603	0.548	0.499	0.456	0.419	0.384	0.353	0.326	0.303	0.281	0.260	0.242	0.225	0.211	0.196	0.186	0.174	0.162					
1989	14,561	0.849	0.761	0.687	0.618	0.561	0.511	0.466	0.427	0.391	0.359	0.333	0.308	0.286	0.266	0.248	0.232	0.216	0.202	0.192	0.178						
1990	16,523	0.839	0.749	0.674	0.610	0.555	0.501	0.459	0.419	0.384	0.353	0.325	0.300	0.278	0.260	0.243	0.227	0.211	0.195	0.183							
1991	18,215	0.828	0.735	0.662	0.598	0.539	0.488	0.445	0.407	0.375	0.345	0.318	0.293	0.272	0.254	0.236	0.221	0.206	0.193								
1992	19,909	0.821	0.727	0.650	0.587	0.530	0.481	0.437	0.400	0.367	0.340	0.314	0.290	0.270	0.249	0.231	0.215	0.200									
1993	20,887	0.832	0.742	0.666	0.597	0.542	0.490	0.446	0.407	0.374	0.344	0.317	0.293	0.270	0.252	0.235	0.218										
1994	21,433	0.830	0.744	0.670	0.604	0.545	0.492	0.449	0.411	0.375	0.344	0.314	0.292	0.270	0.249	0.230											
1995	22,893	0.841	0.754	0.680	0.611	0.554	0.505	0.462	0.423	0.387	0.355	0.326	0.301	0.277	0.254												
1996	24,949	0.832	0.750	0.674	0.611	0.556	0.509	0.458	0.420	0.385	0.352	0.324	0.296	0.272													
1997	25,571	0.838	0.752	0.681	0.620	0.563	0.514	0.470	0.426	0.391	0.358	0.328	0.300														
1998	26,851	0.845	0.766	0.698	0.637	0.576	0.526	0.477	0.435	0.399	0.367	0.337															
1999	27,819	0.851	0.774	0.706	0.641	0.582	0.530	0.484	0.443	0.403	0.366																
2000	29,307	0.856	0.777	0.711	0.649	0.591	0.537	0.491	0.446	0.407																	
2001	30,906	0.855	0.775	0.707	0.641	0.587	0.535	0.487	0.445																		
2002	31,639	0.859	0.781	0.713	0.650	0.590	0.537	0.489																			
2003	32,718	0.860	0.783	0.715	0.652	0.595	0.541																				
2004	33,934	0.867	0.790	0.723	0.663	0.604																					
2005	35,026	0.863	0.788	0.720	0.658																						
2006	36,242	0.871	0.795	0.728																							
2007	37,073	0.868	0.798																								
2008	37,811	0.868																									

患者調査による集計

#### 解説

経年的な導入患者の生存率を図表に示す。1年生存率は2008年に導入した37,881人の検討では86.8%であった。2004年導入患者の5年生存率は60.4%、1999年導入患者の10年生存率は36.6%、1994年導入患者の15年生存率は23.0%、1989年導入患者の20年生存率は17.8%、1984年導入患者の25年生存率は15.8%であった。