


## 2) PD療法の現状

### (4) 治療方法別年齢別原疾患 (図表31)



年齢		15歳未満	15歳～	30歳～	45歳～	60歳～	75歳～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F) 単独	糸球体腎炎	1	431	5,401	19,571	36,350	18,641	80,395	3	80,398	64.68	12.68
	糖尿病	1	46	2,725	15,447	38,160	18,259	74,638	0	74,638	66.40	10.96
	それ以外	6	529	3,620	10,912	21,963	19,200	56,230	2	56,232	67.13	13.92
PD単独	糸球体腎炎	9	32	271	798	929	285	2,324	0	2,324	59.27	13.33
	糖尿病	0	3	91	486	809	260	1,649	0	1,649	63.21	11.24
	それ以外	42	50	160	438	683	433	1,806	0	1,806	61.90	17.32
HD(F) 単独・PDカテあり	糸球体腎炎	0	2	19	25	52	17	115	0	115	59.75	13.89
	糖尿病	0	0	6	18	29	11	64	0	64	61.95	12.80
	それ以外	0	2	6	9	24	10	51	0	51	62.24	15.52
PD・HD(F)併用	糸球体腎炎	0	14	117	300	303	49	783	0	783	56.74	12.13
	糖尿病	0	1	39	186	132	26	384	0	384	57.82	10.38
	それ以外	0	12	53	132	127	50	374	0	374	57.93	14.46

患者調査による集計

#### 解説

HD(F)単独患者に占める糖尿病の比率は35.3%、PD単独患者では28.5%、PD・HD(F)併用患者で24.9%であった。

HD(F)単独患者、PD単独患者ともに糖尿病の占める割合は60～74歳でもっとも多く、糸球体腎炎は30～44歳でもっとも多かった。