


2) PD療法の現状

(5) 治療方法別体格 (図表32)



透析前体重		20未満	20～	40～	60～	80～	100～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F) 単独	男	25	1,569	63,535	52,001	5,997	813	123,940	6,718	130,658	60.61	11.49
	女	16	11,775	54,673	9,131	774	74	76,443	4,161	80,604	49.31	10.08
PD 単独	男	11	20	703	1,260	155	13	2,162	1,379	3,541	64.11	11.63
	女	15	91	966	252	18	4	1,346	892	2,238	52.27	12.59
HD(F) 単独・PDカテーテルあり	男	0	0	48	68	3	1	120	14	134	62.61	10.83
	女	0	11	62	9	2	0	84	12	96	49.59	10.43
PD・HD(F) 併用	男	0	1	283	495	72	14	865	197	1,062	65.53	11.88
	女	0	31	279	71	4	0	385	94	479	52.14	9.54

身長		130未満	130～	140～	150～	160～	170～	180～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F) 単独	男	96	161	1,997	23,242	57,067	22,925	1,607	25	107,120	23,538	130,658	164.07	7.35
	女	183	2,614	22,597	33,171	6,794	362	14	1	65,736	14,868	80,604	151.10	7.08
PD 単独	男	11	3	32	371	1,171	594	39	1	2,222	1,319	3,541	164.95	9.00
	女	20	43	402	775	189	14	0	0	1,443	795	2,238	151.52	10.01
HD(F) 単独・PDカテーテルあり	男	0	0	1	10	64	35	2	0	112	22	134	167.14	5.91
	女	0	0	18	45	15	1	0	0	79	17	96	154.14	6.73
PD・HD(F) 併用	男	0	0	2	101	397	266	20	1	787	275	1,062	166.67	6.61
	女	2	4	82	209	61	1	0	0	359	120	479	153.21	6.77

BMI		16未満	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F) 単独	男	2,755	10,372	23,323	27,310	21,152	11,575	5,286	4,233	106,006	24,652	130,658	21.55	4.11
	女	4,508	11,189	15,892	13,671	9,019	5,164	2,750	2,900	65,093	15,511	80,604	20.70	5.04
PD 単独	男	27	39	184	381	528	373	194	159	1,885	1,656	3,541	23.48	5.06
	女	32	86	205	258	237	156	99	119	1,192	1,046	2,238	22.72	5.66
HD(F) 単独・PDカテーテルあり	男	1	7	28	32	25	9	6	2	110	24	134	21.51	3.15
	女	6	23	16	15	6	5	3	3	77	19	96	20.04	3.96
PD・HD(F) 併用	男	1	16	76	165	218	118	79	72	745	317	1,062	23.53	3.62
	女	7	26	77	82	61	37	25	24	339	140	479	22.00	3.62

患者調査による集計

解説

併用状況別に体格を比較すると、HD(F)単独患者よりPD単独患者、PD・HD併用患者の方が体重、身長、BMIとも大きかった。体格は栄養状態を考える基本的な指標であるが、PD患者は平均年齢がHD(F)患者よりも若年であること、PD液貯留の影響、体液過剰状態などの影響を含めて考える必要がある。