


4) 認知症

(2) 性別、年齢と認知症 (図表52)



認知症 年齢別 (施設血液透析患者 男性のみ)

年齢	なし	あり (サポート不要)	あり (サポート必要)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	4 (80.0)	1 (20.0)	0	5 (100.0)	0	1	6
15歳～ (%)	616 (98.6)	6 (1.0)	3 (0.5)	625 (100.0)	10	137	772
30歳～ (%)	7,495 (99.4)	22 (0.3)	22 (0.3)	7,539 (100.0)	63	1,729	9,331
45歳～ (%)	27,936 (98.5)	233 (0.8)	206 (0.7)	28,375 (100.0)	278	6,143	34,796
60歳～ (%)	55,245 (93.5)	1,915 (3.2)	1,938 (3.3)	59,098 (100.0)	736	13,018	72,852
75歳～ (%)	24,175 (79.5)	2,852 (9.4)	3,373 (11.1)	30,400 (100.0)	431	6,689	37,520
90歳～ (%)	668 (61.6)	152 (14.0)	265 (24.4)	1,085 (100.0)	22	217	1,324
合計 (%)	116,139 (91.4)	5,181 (4.1)	5,807 (4.6)	127,127 (100.0)	1,540	27,934	156,601
記載なし (%)	5 (62.5)	2 (25.0)	1 (12.5)	8 (100.0)	0	11	19
総計 (%)	116,144 (91.4)	5,183 (4.1)	5,808 (4.6)	127,135 (100.0)	1,540	27,945	156,620
平均	64.39	75.05	76.22	65.37	67.39	65.36	65.38
標準偏差	12.19	8.94	8.94	12.36	12.02	12.38	12.36

認知症 年齢別 (施設血液透析患者 女性のみ)

年齢	なし	あり (サポート不要)	あり (サポート必要)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (100.0)	0	0	1 (100.0)	0	2	3
15歳～ (%)	332 (99.1)	1 (0.3)	2 (0.6)	335 (100.0)	5	77	417
30歳～ (%)	3,643 (99.2)	11 (0.3)	17 (0.5)	3,671 (100.0)	32	810	4,513
45歳～ (%)	14,914 (98.2)	139 (0.9)	131 (0.9)	15,184 (100.0)	151	3,298	18,633
60歳～ (%)	31,165 (92.3)	1,176 (3.5)	1,435 (4.2)	33,776 (100.0)	475	7,425	41,676
75歳～ (%)	16,536 (71.9)	2,497 (10.9)	3,961 (17.2)	22,994 (100.0)	360	5,042	28,396
90歳～ (%)	747 (52.1)	211 (14.7)	475 (33.1)	1,433 (100.0)	28	309	1,770
合計 (%)	67,338 (87.0)	4,035 (5.2)	6,021 (7.8)	77,394 (100.0)	1,051	16,963	95,408
記載なし (%)	3 (100.0)	0	0	3 (100.0)	0	12	15
総計 (%)	67,341 (87.0)	4,035 (5.2)	6,021 (7.8)	77,397 (100.0)	1,051	16,975	95,423
平均	65.83	77.26	78.94	67.45	69.78	67.40	67.46
標準偏差	12.41	8.87	8.59	12.70	12.34	12.68	12.70

患者調査による集計

解説

施設血液透析患者について、性別及び年齢別に認知症合併状況を集計した。15歳以上の年齢層では、60歳を越えると認知症の合併率が增大することが明らかである。性別では、30歳以上のどの年齢層においても女性のほうが男性よりも認知症合併率が高い結果であった。15歳未満については集計対象患者数が5名と極少数であり、その解釈には慎重を要すると考えられるため、年齢別集計グラフ (図表45、46、47) では15歳未満を図示していない。