


4) 認知症

(4) 脳血管障害既往の有無と認知症 (図表54)



認知症 年齢別 (施設血液透析患者) 脳梗塞・脳出血共に既往なし

年齢	なし	あり (サポート不要)	あり (サポート必要)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	3 (100.0)	0	0	3 (100.0)	0	0	3
15歳~ (%)	880 (98.9)	5 (0.6)	5 (0.6)	890 (100.0)	6	9	905
30歳~ (%)	10,162 (99.5)	22 (0.2)	30 (0.3)	10,214 (100.0)	42	76	10,332
45歳~ (%)	36,231 (99.1)	189 (0.5)	125 (0.3)	36,545 (100.0)	151	337	37,033
60歳~ (%)	68,267 (95.7)	1,658 (2.3)	1,381 (1.9)	71,306 (100.0)	360	728	72,394
75歳~ (%)	31,485 (81.2)	3,350 (8.6)	3,958 (10.2)	38,793 (100.0)	299	433	39,525
90歳~ (%)	1,109 (61.0)	256 (14.1)	454 (25.0)	1,819 (100.0)	18	23	1,860
合計 (%)	148,137 (92.8)	5,480 (3.4)	5,953 (3.7)	159,570 (100.0)	876	1,606	162,052
記載なし (%)	8 (88.9)	1 (11.1)	0	9 (100.0)	0	0	9
総計 (%)	148,145 (92.8)	5,481 (3.4)	5,953 (3.7)	159,579 (100.0)	876	1,606	162,061
平均	64.34	76.77	78.73	65.31	68.42	66.40	65.33
標準偏差	12.54	8.91	8.80	12.79	13.02	12.48	12.79

認知症 年齢別 (施設血液透析患者) 脳梗塞・脳出血のいずれか又は両者に既往あり

年齢	なし	あり (サポート不要)	あり (サポート必要)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (50.0)	1 (50.0)	0	2 (100.0)	0	0	2
15歳~ (%)	22 (91.7)	2 (8.3)	0	24 (100.0)	0	1	25
30歳~ (%)	466 (96.1)	10 (2.1)	9 (1.9)	485 (100.0)	6	6	497
45歳~ (%)	4,541 (92.9)	159 (3.3)	187 (3.8)	4,887 (100.0)	71	47	5,005
60歳~ (%)	13,759 (82.9)	1,153 (6.9)	1,686 (10.2)	16,598 (100.0)	322	149	17,069
75歳~ (%)	7,122 (62.2)	1,573 (13.7)	2,751 (24.0)	11,446 (100.0)	202	126	11,774
90歳~ (%)	234 (43.2)	83 (15.3)	225 (41.5)	542 (100.0)	10	2	554
合計 (%)	26,145 (76.9)	2,981 (8.8)	4,858 (14.3)	33,984 (100.0)	611	331	34,926
記載なし (%)	0	1 (50.0)	1 (50.0)	2 (100.0)	0	0	2
総計 (%)	26,145 (76.9)	2,982 (8.8)	4,859 (14.3)	33,986 (100.0)	611	331	34,928
平均	68.06	74.70	76.21	69.81	70.52	70.05	69.82
標準偏差	10.32	9.08	8.85	10.52	9.91	10.78	10.51

患者調査による集計

解説

施設血液透析患者について、脳血管障害 (脳梗塞・脳出血) 既往の存在と認知症合併状況との関係を年齢別に集計した。15歳以上ではどの年齢層においても、脳血管障害の既往がある患者では、それがない患者よりも認知症合併率は高い結果である。脳血管障害は脳血管性痴呆発症の危険因子であり、今回の結果と矛盾しない。