


5) 生活活動度

(2) 年齢と日常生活活動度 (図表57)



生活活動度 年齢別 (施設血液透析患者) 糖尿病性腎症以外の原疾患のみ

年齢	無症状	軽度症状	50%以上起居	50%以上就床	終日就床	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	0	5 (100.0)	0	3	8
15歳~ (%)	676 (76.0)	170 (19.1)	20 (2.2)	11 (1.2)	13 (1.5)	890 (100.0)	24	215	1,129
30歳~ (%)	6,211 (73.8)	1,843 (21.9)	200 (2.4)	97 (1.2)	61 (0.7)	8,412 (100.0)	83	1,983	10,478
45歳~ (%)	18,233 (65.5)	7,516 (27.0)	1,150 (4.1)	557 (2.0)	390 (1.4)	27,846 (100.0)	272	6,419	34,537
60歳~ (%)	27,449 (50.4)	17,663 (32.5)	5,009 (9.2)	2,391 (4.4)	1,911 (3.5)	54,423 (100.0)	594	12,807	67,824
75歳~ (%)	9,509 (26.7)	10,418 (29.2)	7,859 (22.1)	4,264 (12.0)	3,571 (10.0)	35,621 (100.0)	365	8,131	44,117
90歳~ (%)	226 (10.9)	294 (14.2)	586 (28.3)	480 (23.2)	487 (23.5)	2,073 (100.0)	25	443	2,541
合計 (%)	62,305 (48.2)	37,906 (29.3)	14,825 (11.5)	7,801 (6.0)	6,433 (5.0)	129,270 (100.0)	1,363	30,001	160,634
記載なし (%)	3 (50.0)	2 (33.3)	0	1 (16.7)	0	6 (100.0)	0	13	19
総計 (%)	62,308 (48.2)	37,908 (29.3)	14,825 (11.5)	7,802 (6.0)	6,433 (5.0)	129,276 (100.0)	1,363	30,014	160,653
平均	61.46	66.65	74.46	75.63	76.24	66.06	66.20	65.95	66.04
標準偏差	12.84	12.10	10.75	11.10	10.82	13.34	13.93	13.28	13.33

生活活動度 年齢別 (施設血液透析患者) 糖尿病性腎症のみ

年齢	無症状	軽度症状	50%以上起居	50%以上就床	終日就床	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	0	0	1 (100.0)	0	0	1 (100.0)	0	0	1
15歳~ (%)	33 (66.0)	14 (28.0)	2 (4.0)	1 (2.0)	0	50 (100.0)	1	9	60
30歳~ (%)	1,622 (60.2)	736 (27.3)	214 (7.9)	79 (2.9)	44 (1.6)	2,695 (100.0)	29	642	3,366
45歳~ (%)	8,098 (52.7)	4,691 (30.5)	1,432 (9.3)	689 (4.5)	459 (3.0)	15,369 (100.0)	151	3,372	18,892
60歳~ (%)	14,761 (38.8)	11,819 (31.0)	5,839 (15.3)	3,147 (8.3)	2,500 (6.6)	38,066 (100.0)	438	8,206	46,710
75歳~ (%)	3,875 (21.8)	4,547 (25.6)	4,264 (24.0)	2,734 (15.4)	2,335 (13.2)	17,755 (100.0)	185	3,860	21,800
90歳~ (%)	44 (9.6)	49 (10.7)	126 (27.5)	113 (24.7)	126 (27.5)	458 (100.0)	7	89	554
合計 (%)	28,433 (38.2)	21,856 (29.4)	11,878 (16.0)	6,763 (9.1)	5,464 (7.3)	74,394 (100.0)	811	16,178	91,383
記載なし (%)	1 (20.0)	4 (80.0)	0	0	0	5 (100.0)	0	10	15
総計 (%)	28,434 (38.2)	21,860 (29.4)	11,878 (16.0)	6,763 (9.1)	5,464 (7.3)	74,399 (100.0)	811	16,188	91,398
平均	62.91	65.78	70.20	71.49	72.67	66.41	66.65	66.30	66.40
標準偏差	10.69	10.38	10.19	10.03	9.68	10.96	10.70	11.05	10.98

患者調査による集計

解説

施設血液透析患者を対象に、年齢とADLとの関係を集計した結果、15歳以上では加齢に伴ってADLの低い患者が増大していた。75～89歳ではADLが“50%以上起居”以下の患者が約半数を占め、90歳以上ではこれが7割以上を占めていた。

糖尿病の有無では、15歳以上ではどの年齢層においても糖尿病患者において非糖尿病患者よりもADLの低い患者が多く認められた。なお、15歳未満でADLに回答のあった患者は全体で6名と極少数であり、その解釈には慎重を要すると考えられるため、グラフ内に15歳未満は図示していない。