


3) 導入患者の現状

(1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満	8 (0.0)	9 (0.1)	17 (0.0)	0	17 (0.0)
5歳～	1 (0.0)	2 (0.0)	3 (0.0)	0	3 (0.0)
10歳～	7 (0.0)	2 (0.0)	9 (0.0)	0	9 (0.0)
15歳～	26 (0.1)	13 (0.1)	39 (0.1)	0	39 (0.1)
20歳～	58 (0.2)	32 (0.3)	90 (0.2)	0	90 (0.2)
25歳～	108 (0.4)	52 (0.4)	160 (0.4)	0	160 (0.4)
30歳～	202 (0.8)	111 (0.9)	313 (0.8)	0	313 (0.8)
35歳～	453 (1.8)	218 (1.7)	671 (1.8)	0	671 (1.8)
40歳～	731 (3.0)	277 (2.2)	1,008 (2.7)	0	1,008 (2.7)
45歳～	1,041 (4.2)	416 (3.3)	1,457 (3.9)	0	1,457 (3.9)
50歳～	1,366 (5.5)	574 (4.5)	1,940 (5.2)	0	1,940 (5.2)
55歳～	2,199 (8.9)	892 (7.0)	3,091 (8.3)	0	3,091 (8.3)
60歳～	3,412 (13.8)	1,432 (11.3)	4,844 (12.9)	1 (100.0)	4,845 (12.9)
65歳～	3,544 (14.3)	1,585 (12.5)	5,129 (13.7)	0	5,129 (13.7)
70歳～	3,831 (15.5)	1,739 (13.7)	5,570 (14.9)	0	5,570 (14.9)
75歳～	3,769 (15.2)	2,081 (16.4)	5,850 (15.6)	0	5,850 (15.6)
80歳～	2,619 (10.6)	1,917 (15.1)	4,536 (12.1)	0	4,536 (12.1)
85歳～	1,117 (4.5)	1,064 (8.4)	2,181 (5.8)	0	2,181 (5.8)
90歳～	233 (0.9)	239 (1.9)	472 (1.3)	0	472 (1.3)
95歳～	28 (0.1)	27 (0.2)	55 (0.1)	0	55 (0.1)
合計	24,753 (100.0)	12,682 (100.0)	37,435 (100.0)	1 (100.0)	37,436 (100.0)
記載なし	83	34	117	2	119
総計	24,836	12,716	37,552	3	37,555
平均	66.87	69.46	67.75	62.00	67.75
標準偏差	13.03	13.60	13.28		13.28

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

患者調査による集計

解説

患者調査表に記載された2010年導入患者数は37,555人、年齢と性別の記載された合計は3,7435人であった。このうち男性は24,753人で、女性は12,682人であり、前年度と同様に男性が圧倒的に多かった。最も割合が高い年齢層は男性で70～75歳で15.5%、女性では75～80歳で16.4%であり、同様の傾向が近年続いている。このような導入年齢分布を反映して、導入時平均年齢は男性が66.9歳で前年と比較し0.5歳、女性は69.5歳で0.4歳高齢化した。全体の平均年齢は67.8歳で、前年との比較では0.5歳増加した。