

6) 年間粗死亡率と生存率

(2) 導入後1年・5年・10年・15年・20年・25年生存率の推移 (図表21)



導入年	人数	1年生存率	2年生存率	3年生存率	4年生存率	5年生存率	6年生存率	7年生存率	8年生存率	9年生存率	10年生存率	11年生存率	12年生存率	13年生存率	14年生存率	15年生存率	16年生存率	17年生存率	18年生存率	19年生存率	20年生存率	21年生存率	22年生存率	23年生存率	24年生存率	25年生存率	26年生存率	27年生存率
1983	9,866	0.818	0.746	0.680	0.631	0.587	0.553	0.520	0.482	0.453	0.422	0.393	0.369	0.345	0.326	0.304	0.286	0.269	0.253	0.239	0.225	0.212	0.198	0.187	0.178	0.165	0.154	0.143
1984	10,696	0.817	0.735	0.670	0.619	0.576	0.537	0.497	0.463	0.434	0.405	0.376	0.352	0.327	0.305	0.286	0.269	0.251	0.237	0.224	0.210	0.196	0.186	0.177	0.165	0.156	0.148	
1985	11,599	0.795	0.720	0.660	0.609	0.563	0.520	0.484	0.443	0.411	0.384	0.359	0.335	0.310	0.287	0.269	0.251	0.234	0.219	0.206	0.190	0.177	0.166	0.154	0.145	0.135		
1986	12,615	0.799	0.724	0.666	0.617	0.565	0.520	0.479	0.444	0.407	0.378	0.351	0.327	0.305	0.283	0.267	0.250	0.233	0.220	0.208	0.195	0.182	0.172	0.161	0.153			
1987	13,541	0.814	0.737	0.670	0.606	0.555	0.506	0.461	0.425	0.392	0.363	0.337	0.313	0.292	0.270	0.251	0.236	0.218	0.201	0.188	0.178	0.168	0.157	0.147				
1988	14,740	0.824	0.739	0.665	0.602	0.547	0.498	0.455	0.417	0.382	0.352	0.325	0.301	0.280	0.258	0.240	0.224	0.209	0.195	0.184	0.172	0.160	0.149					
1989	14,548	0.848	0.760	0.686	0.617	0.560	0.511	0.465	0.426	0.391	0.359	0.333	0.308	0.286	0.265	0.247	0.231	0.215	0.201	0.191	0.177	0.166						
1990	16,515	0.839	0.749	0.674	0.610	0.555	0.501	0.459	0.419	0.384	0.353	0.325	0.300	0.278	0.260	0.243	0.227	0.211	0.195	0.182	0.172							
1991	18,173	0.827	0.734	0.660	0.596	0.537	0.486	0.443	0.405	0.373	0.343	0.316	0.291	0.271	0.252	0.234	0.219	0.204	0.190	0.178								
1992	19,874	0.821	0.727	0.650	0.587	0.530	0.481	0.437	0.399	0.366	0.339	0.313	0.288	0.269	0.247	0.230	0.213	0.199	0.183									
1993	20,862	0.832	0.742	0.666	0.597	0.541	0.490	0.445	0.407	0.374	0.344	0.317	0.293	0.269	0.251	0.234	0.216	0.201										
1994	21,371	0.829	0.742	0.669	0.603	0.543	0.491	0.448	0.410	0.374	0.342	0.313	0.290	0.268	0.247	0.228	0.212											
1995	22,839	0.840	0.753	0.678	0.609	0.552	0.503	0.460	0.421	0.385	0.353	0.324	0.299	0.275	0.251	0.231												
1996	24,854	0.832	0.750	0.674	0.611	0.556	0.508	0.457	0.419	0.383	0.351	0.322	0.294	0.269	0.249													
1997	25,442	0.837	0.751	0.679	0.618	0.561	0.511	0.466	0.424	0.388	0.354	0.324	0.295	0.272														
1998	26,758	0.844	0.764	0.696	0.635	0.573	0.523	0.474	0.432	0.396	0.364	0.333	0.306															
1999	27,691	0.850	0.773	0.705	0.639	0.580	0.528	0.481	0.440	0.400	0.362	0.331																
2000	29,167	0.855	0.776	0.710	0.646	0.588	0.534	0.488	0.443	0.403	0.367																	
2001	30,727	0.854	0.774	0.705	0.639	0.584	0.532	0.484	0.441	0.402																		
2002	31,466	0.858	0.780	0.712	0.649	0.589	0.534	0.485	0.442																			
2003	32,448	0.859	0.781	0.713	0.649	0.591	0.536	0.489																				
2004	33,606	0.865	0.787	0.720	0.659	0.599	0.546																					
2005	34,689	0.861	0.785	0.717	0.653	0.596																						
2006	36,051	0.870	0.793	0.725	0.664																							
2007	36,748	0.866	0.793	0.727																								
2008	37,694	0.866	0.797																									
2009	37,948	0.874																										

患者調査による集計

解説

経年的な導入患者の生存率を図表に示す。1年生存率は2009年に導入した37,948人で検討して87.4%であった。2005年導入患者の5年生存率は59.6%、2000年導入患者の10年生存率は36.7%、1995年導入患者の15年生存率は23.1%、1990年導入患者の20年生存率は17.2%、1985年導入患者の25年生存率は13.5%であった。