


## 7) 腹膜透析調査

今回の腹膜透析調査は電子媒体（エクセルファイル）のみで実施した。シートⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ全部回収した4,042施設のうち、電子媒体で回収した施設は3,466施設であった。

### (1) 腹膜透析方法と透析液の一日使用量 (A)、使用透析液 (B) (図表38)



一日透析液 使用量 (L)	PD単独	PD,HD併用 週1HD (F)	PD,HD併用 週2HD (F)	PD,HD併用 週3HD (F)	PD,HD併用 その他	合計
2未満	70 (1.8)	17 (2.5)	1 (1.2)	5 (45.5)	2 (3.6)	95 (2.0)
2～	252 (6.5)	15 (2.2)	6 (7.4)	1 (9.1)	1 (1.8)	275 (5.8)
4～	730 (18.7)	52 (7.7)	15 (18.5)	0	2 (3.6)	799 (16.9)
6～	1,382 (35.4)	173 (25.5)	28 (34.6)	1 (9.1)	10 (18.2)	1,594 (33.7)
8～	1,030 (26.4)	263 (38.7)	24 (29.6)	2 (18.2)	28 (50.9)	1,347 (28.5)
10～	299 (7.7)	102 (15.0)	3 (3.7)	2 (18.2)	8 (14.5)	414 (8.8)
12～	140 (3.6)	57 (8.4)	4 (4.9)	0	4 (7.3)	205 (4.3)
合計	3,903 (100.0)	679 (100.0)	81 (100.0)	11 (100.0)	55 (100.0)	4,729 (100.0)
記載なし	3,001	611	132	39	70	3,853
総計	6,904	1,290	213	50	125	8,582
平均	6.79	8.02	6.77	4.75	7.99	6.98
標準偏差	2.56	2.76	2.58	3.93	2.55	2.63

使用透析液の種類	PD単独	PD,HD併用 週1HD (F)	PD,HD併用 週2HD (F)	PD,HD併用 週3HD (F)	PD,HD併用 その他	合計
1.5%液のみ	1,552 (37.9)	109 (15.7)	14 (15.7)	4 (30.8)	8 (13.3)	1,687 (34.0)
1.5%液と2.5%液の併用	634 (15.5)	179 (25.8)	24 (27.0)	2 (15.4)	8 (13.3)	847 (17.1)
2.5%液のみ	116 (2.8)	19 (2.7)	8 (9.0)	0	1 (1.7)	144 (2.9)
1.5%+イコデキストリン	913 (22.3)	116 (16.7)	13 (14.6)	1 (7.7)	12 (20.0)	1,055 (21.3)
1.5%+2.5%+イコデキストリン	454 (11.1)	154 (22.2)	11 (12.4)	1 (7.7)	16 (26.7)	636 (12.8)
2.5%+イコデキストリン	273 (6.7)	81 (11.7)	11 (12.4)	1 (7.7)	11 (18.3)	377 (7.6)
イコデキストリン単独	35 (0.9)	7 (1.0)	4 (4.5)	4 (30.8)	0	50 (1.0)
上記以外で4.25%の使用あり	3 (0.1)	5 (0.7)	0	0	0	8 (0.2)
上記以外	120 (2.9)	25 (3.6)	4 (4.5)	0	4 (6.7)	153 (3.1)
合計	4,100 (100.0)	695 (100.0)	89 (100.0)	13 (100.0)	60 (100.0)	4,957 (100.0)
不明	7	1	0	0	0	8
記載なし	2,797	594	124	37	65	3,617
総計	6,904	1,290	213	50	125	8,582

患者調査による集計

### 解説

シートⅠの施設調査ではPD患者が9,728人と集計されたが、個別調査は調査項目により回答率に大きな開きがあった。併用状況に回答のあった8,582例中PD単独施行例は、6,904例（80.4%）であり、約20%がHD(F)と併用を行っていた。

透析液使用量は4,729例から回答があり、全例では6～8Lが33.7%で最も多く、次いで8～10Lが28.5%であった。PD単独例でも6～8Lが35.4%と最も多く、10L以上の使用例は11.2%であるが、週1回のHD(F)併用例では、8～10Lが38.7%と最も多く、10L以上の使用例は23.4%であった。

使用透析液には4,957例の回答があり、全例ではブドウ糖1.5%液のみ使用は34.0%でありPD単独患者に多かった。イコデキストリンは回答のあった42.7%の症例に使用されており、1.5%、2.5%透析液と併用される他、単独使用も50例（1%）あった。