


3) 導入患者の現状

(1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満	4 (0.0)	5 (0.0)	9 (0.0)	0	9 (0.0)
5歳～	5 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	0	6 (0.0)
10歳～	11 (0.0)	4 (0.0)	15 (0.0)	0	15 (0.0)
15歳～	16 (0.1)	14 (0.1)	30 (0.1)	0	30 (0.1)
20歳～	55 (0.2)	25 (0.2)	80 (0.2)	0	80 (0.2)
25歳～	116 (0.5)	67 (0.5)	183 (0.5)	0	183 (0.5)
30歳～	229 (0.9)	107 (0.8)	336 (0.9)	0	336 (0.9)
35歳～	475 (1.8)	214 (1.7)	689 (1.8)	0	689 (1.8)
40歳～	858 (3.3)	317 (2.5)	1,175 (3.1)	0	1,175 (3.1)
45歳～	1,028 (4.0)	406 (3.2)	1,434 (3.7)	0	1,434 (3.7)
50歳～	1,432 (5.6)	509 (4.0)	1,941 (5.1)	0	1,941 (5.1)
55歳～	2,242 (8.7)	859 (6.8)	3,101 (8.1)	0	3,101 (8.1)
60歳～	3,732 (14.5)	1,457 (11.5)	5,189 (13.5)	0	5,189 (13.5)
65歳～	3,311 (12.9)	1,431 (11.3)	4,742 (12.4)	0	4,742 (12.4)
70歳～	3,823 (14.9)	1,840 (14.5)	5,663 (14.8)	0	5,663 (14.8)
75歳～	3,991 (15.5)	2,184 (17.2)	6,175 (16.1)	0	6,175 (16.1)
80歳～	2,846 (11.1)	1,885 (14.8)	4,731 (12.3)	0	4,731 (12.3)
85歳～	1,213 (4.7)	1,071 (8.4)	2,284 (5.9)	0	2,284 (5.9)
90歳～	266 (1.0)	266 (2.1)	532 (1.4)	0	532 (1.4)
95歳～	27 (0.1)	50 (0.4)	77 (0.2)	0	77 (0.2)
合計	25,680 (100.0)	12,712 (100.0)	38,392 (100.0)	0	38,392 (100.0)
記載なし	53	26	79	3	82
総計	25,733	12,738	38,471	3	38,474
平均	66.93	69.69	67.84		67.84
標準偏差	13.19	13.63	13.40		13.40

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

患者調査による集計

解説

患者調査表(シートⅡ～Ⅳ)に記載された2011年導入患者数は38,474人、年齢と性別の記載された合計は38,392人であった。このうち男性は25,680人で、女性は12,712人であり、前年度と同様に男性が圧倒的に多かった。最も割合が高い年齢層は男性で75～80歳で15.5%、女性も75～80歳で17.2%であった。昨年は男性のピークは70～75歳であったが、2011年には男女ともに75～80歳が最頻値となったようである。導入時平均年齢は男性が66.93歳で前年と比べ0.02歳の増加で、女性の導入時平均年齢は69.7歳で比較し0.2歳高齢化した。女性群では80歳以上が25.7%も存在するのに、男性では16.9%しかいないことの片影である。全体の平均年齢は67.8歳で、前年との比較では0.05歳増加した。