

3) 腹膜透析調査

(1) PD患者の現況と透析液使用量 (図表35)

PD患者の現況


	人数
腹膜透析	9,626
腹膜カテーテルを残している洗浄患者など	378
腹膜透析新規導入年内脱落患者数	176

HD,HDF等とPDを併用している患者数	1,902
----------------------	-------

施設調査による集計




PD歴別のPD.HD(F)併用療法



PD歴	1年未満	1年~	2年~	4年~	8年~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独 (%)	1,075 (94.8)	828 (91.3)	1,216 (83.2)	938 (69.2)	260 (48.7)	4,317 (80.1)	2,574 (81.3)	6,891 (80.5)	2.60	2.83
PD.HD併用週1HD(F) (%)	43 (3.8)	62 (6.8)	198 (13.6)	333 (24.6)	193 (36.1)	829 (15.4)	475 (15.0)	1,304 (15.2)	5.34	3.85
PD.HD併用週2HD(F) (%)	5 (0.4)	9 (1.0)	31 (2.1)	53 (3.9)	49 (9.2)	147 (2.7)	68 (2.1)	215 (2.5)	6.25	4.15
PD.HD併用週3HD(F) (%)	5 (0.4)	3 (0.3)	7 (0.5)	9 (0.7)	6 (1.1)	30 (0.6)	17 (0.5)	47 (0.5)	4.77	4.35
PD.HD併用その他 (%)	6 (0.5)	5 (0.6)	9 (0.6)	23 (1.7)	26 (4.9)	69 (1.3)	34 (1.1)	103 (1.2)	6.88	5.48
合計 (%)	1,134 (100.0)	907 (100.0)	1,461 (100.0)	1,356 (100.0)	534 (100.0)	5,392 (100.0)	3,168 (100.0)	8,560 (100.0)	3.19	3.33

患者調査による集計

PD.HD(F)併用療法別のPD透析液使用量(平均値)



透析液使用量 (L/日)	PD単独	PD.HD併用週1HD(F)	PD.HD併用週2HD(F)	PD.HD併用週3HD(F)	PD.HD併用その他	合計
患者数	3,830	624	108	15	54	4,631
平均	6.72	8.17	6.63	6.12	8.40	6.93
標準偏差	2.48	2.29	2.62	5.88	2.71	2.54

患者調査による集計

解説

2011年末の施設調査では、腹膜透析 (PD) 患者数は9,626人、腹膜カテーテルを残している洗浄患者378人と、腹膜透析新規導入後年内脱落患者176人を含めると年間のPD患者総数は10,180人であった。

PD・HD (F) 併用療法について8,560人の回答があり、PD単独は80.5%、HD (F) 週1回併用は15.2%、週2回併用は2.5%であった。PD・HD (F) 併用療法とPD歴の両方に回答があった患者5,392人に対して、PD歴と併用療法を検討した。PD歴1年未満では5.2%、1~2年未満では8.7%、2~4年未満では16.8%、4~8年未満では30.8%、8年以上では51.3%とPD歴が長い群で併用療法の割合が高かった。

透析液の使用量はPD単独で6.7L、週1回の併用は8.2Lと使用量は高値をとったが、週2回併用、週3回併用では低値をとった。