



3) 腹膜透析調査

(6) PD.HD (F) 併用療法とPD Kt/V (図表40)

PD.HD (F) 併用療法別のPD Kt/V



PD.HD (F) 併用療法別のPD Kt/V(平均値)



PDKt/V	PD単独	PD.HD併用 週1 HD(F)	PD.HD併用 週2 HD(F)	PD.HD併用 週3 HD(F)	PD.HD併用 その他	合計
0.1未満 (%)	58 (3.0)	9 (2.6)	3 (4.8)	0	3 (12.0)	73 (3.1)
0.1 ~ (%)	123 (6.4)	24 (6.9)	13 (20.6)	2 (50.0)	0	162 (6.9)
0.4 ~ (%)	200 (10.4)	25 (7.2)	23 (36.5)	2 (50.0)	3 (12.0)	253 (10.7)
0.8 ~ (%)	382 (19.9)	47 (13.5)	7 (11.1)	0	2 (8.0)	438 (18.5)
1.2 ~ (%)	662 (34.4)	140 (40.2)	12 (19.0)	0	7 (28.0)	821 (34.7)
1.7 ~ (%)	266 (13.8)	58 (16.7)	2 (3.2)	0	4 (16.0)	330 (14.0)
2.0 ~ (%)	233 (12.1)	45 (12.9)	3 (4.8)	0	6 (24.0)	287 (12.1)
合計 (%)	1,924 (100.0)	348 (100.0)	63 (100.0)	4 (100.0)	25 (100.0)	2,364 (100.0)
記載なし	4,967	956	152	43	78	6,196
総計	6,891	1,304	215	47	103	8,560
平均	1.28	1.35	0.80	0.35	1.56	1.28
標準偏差	0.66	0.70	0.76	0.13	1.19	0.68

患者調査による集計

解説

腹膜透析の透析量(PD Kt/V)に関する調査は2,364人の回答が得られた。PD Kt/Vの平均値は1.28であり、PD単独では1.28、週1回併用では1.35であった。週2回の併用ではPD Kt/V0.80と低値であった。