



3) 腹膜透析調査

(8) 腹膜炎発症頻度と年齢、PD歴 (図表42)



腹膜炎発症の有無	20歳未満	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	60 (87.0)	49 (84.5)	167 (85.2)	408 (85.0)	813 (83.8)	1,127 (82.6)	614 (74.6)	298 (79.0)	3,536 (81.5)	0	3,536 (81.5)	60.46	14.81
あり (%)	9 (13.0)	9 (15.5)	29 (14.8)	72 (15.0)	157 (16.2)	237 (17.4)	209 (25.4)	79 (21.0)	801 (18.5)	0	801 (18.5)	63.22	14.29
合計 (%)	69 (100.0)	58 (100.0)	196 (100.0)	480 (100.0)	970 (100.0)	1,364 (100.0)	823 (100.0)	377 (100.0)	4,337 (100.0)	0	4,337 (100.0)	60.97	14.75
記載なし	49	64	224	543	903	1,319	749	371	4,222	1	4,223	60.53	14.61
総計	118	122	420	1,023	1,873	2,683	1,572	748	8,559	1	8,560	60.75	14.68



腹膜炎発症の有無	1年未満	1年～	2年～	4年～	8年～	15年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	659 (86.6)	507 (82.6)	806 (78.3)	713 (78.9)	247 (81.8)	37 (94.9)	2,969 (81.4)	567 (82.4)	3,536 (81.5)	3.10	3.34
あり (%)	102 (13.4)	107 (17.4)	223 (21.7)	191 (21.1)	55 (18.2)	2 (5.1)	680 (18.6)	121 (17.6)	801 (18.5)	3.21	2.89
合計 (%)	761 (100.0)	614 (100.0)	1,029 (100.0)	904 (100.0)	302 (100.0)	39 (100.0)	3,649 (100.0)	688 (100.0)	4,337 (100.0)	3.12	3.26
記載なし	373	293	432	452	169	24	1,743	2,480	4,223	3.32	3.45
総計	1,134	907	1,461	1,356	471	63	5,392	3,168	8,560	3.19	3.33

患者調査による集計

解説

腹膜炎に関する調査では4,337人の回答が得られた。調査期間（2011年1月～12月）の一年間に腹膜炎を発症した患者は801人（18.5%）であった。

腹膜炎の発症は高齢者ほど高かった。また、PD歴による発症率では、PD歴2～4年未満が21.7%と最も高く、PD歴が長い15年以上の患者では5.1%と低かった。