


3) 導入患者の現状

(1) 導入患者の年齢と性別 (図表9)



導入時年齢	男性	女性	合計	記載なし	総計
5歳未満	6 (0.0)	4 (0.0)	10 (0.0)	0	10 (0.0)
5歳～	2 (0.0)	4 (0.0)	6 (0.0)	0	6 (0.0)
10歳～	10 (0.0)	4 (0.0)	14 (0.0)	0	14 (0.0)
15歳～	22 (0.1)	11 (0.1)	33 (0.1)	0	33 (0.1)
20歳～	40 (0.2)	25 (0.2)	65 (0.2)	0	65 (0.2)
25歳～	112 (0.5)	42 (0.4)	154 (0.4)	0	154 (0.4)
30歳～	201 (0.8)	84 (0.7)	285 (0.8)	0	285 (0.8)
35歳～	419 (1.7)	202 (1.7)	621 (1.7)	0	621 (1.7)
40歳～	709 (2.9)	295 (2.5)	1,004 (2.7)	0	1,004 (2.7)
45歳～	1,041 (4.2)	345 (2.9)	1,386 (3.8)	0	1,386 (3.8)
50歳～	1,327 (5.4)	517 (4.4)	1,844 (5.0)	0	1,844 (5.0)
55歳～	1,906 (7.7)	699 (5.9)	2,605 (7.1)	0	2,605 (7.1)
60歳～	3,261 (13.2)	1,307 (11.0)	4,568 (12.5)	0	4,568 (12.5)
65歳～	3,405 (13.8)	1,490 (12.6)	4,895 (13.4)	0	4,895 (13.4)
70歳～	3,734 (15.1)	1,620 (13.7)	5,354 (14.7)	0	5,354 (14.7)
75歳～	3,744 (15.2)	1,956 (16.5)	5,700 (15.6)	0	5,700 (15.6)
80歳～	3,033 (12.3)	1,780 (15.0)	4,813 (13.2)	0	4,813 (13.2)
85歳～	1,372 (5.6)	1,139 (9.6)	2,511 (6.9)	0	2,511 (6.9)
90歳～	289 (1.2)	286 (2.4)	575 (1.6)	0	575 (1.6)
95歳～	47 (0.2)	55 (0.5)	102 (0.3)	0	102 (0.3)
合計	24,680 (100.0)	11,865 (100.0)	36,545 (100.0)	0	36,545 (100.0)
記載なし	1	2	3	0	3
総計	24,681	11,867	36,548	0	36,548
平均	67.63	70.12	68.44		68.44
標準偏差	13.18	13.61	13.37		13.37

数値右のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

患者調査による集計

解説

患者調査表に記載された2012年導入患者数は36,548人、年齢と性別の記載された合計は36,545人であった。このうち男性は24,680人で、女性は11,865人であり、前年度と同様に男性が女性の約2倍であった。

昨年同様、最も割合が高い年齢層は男性・女性とも75～80歳であった。導入時平均年齢は男性が67.63歳、女性は70.12歳で、前年と比べそれぞれ0.72歳、0.39歳高齢化した。女性の平均年齢が高いのは、80歳以上が女性では27.5%と、4人に1人を超える割合である一方、男性では19.2%しかいないことの反映であろう。全体の平均年齢は68.44歳で、前年との比較では0.6歳増加した。