


5) 死亡原因

(2) 導入年死亡患者死亡原因の推移 (図表19)



| 年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 心不全 | 32.3 | 33.4 | 32.6 | 32.3 | 30.0 | 26.9 | 22.6 | 23.4 | 24.4 | 23.3 | 22.8 | 26.0 | 24.6 | 23.9 | 23.3 | 24.3 | 22.8 | 23.2 | 24.1 | 21.8 | 24.9 | 25.0 | 25.6 |
| 感染症 | 14.1 | 15.7 | 12.6 | 14.2 | 14.5 | 16.6 | 18.7 | 17.8 | 18.3 | 19.8 | 19.7 | 19.4 | 21.1 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 26.4 | 24.2 | 25.2 | 26.1 | 26.5 | 24.5 | 25.4 |
| 脳血管障害 | 10.8 | 9.5 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 9.5 | 8.2 | 9.2 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.2 |
| 悪性腫瘍 | 8.6 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 9.0 | 6.4 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.1 | 9.4 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 10.4 | 12.5 | 11.6 | 10.7 |
| 心筋梗塞 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.7 |

患者調査による集計

解説

透析に新規導入された年に死亡した患者の死亡原因の推移を図表に示す。2010年から見られていた心不全の増加傾向は継続し、2011年に引き続き、心不全が第一位の死因であった(25.6%)。感染症は昨年同様第二位であった(25.4%)。第三位は悪性腫瘍の10.7%、第四位は脳血管障害(5.2%)、第五位は心筋梗塞で2.7%であった。経年的に心不全、脳血管障害、心筋梗塞などの心血管疾患による死亡は減少傾向にあったが、それが直近の3年間増加傾向に転じている。