


## 6) 年間粗死亡率と生存率

(1) 年別粗死亡率の推移 (図表22)



| 年    | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 粗死亡率 | 9.0  | 8.9  | 9.1  | 9.0  | 8.5  | 9.2  | 7.9  | 9.6  | 8.9  | 9.7  | 9.4  | 9.5  | 9.7  | 9.4  | 9.4  |

| 年    | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 粗死亡率 | 9.2  | 9.7  | 9.2  | 9.3  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.2  | 9.4  | 9.8  | 9.6  | 9.8  | 10.2 | 10.1 |

施設調査による集計

### 解説

導入患者の高齢化、糖尿病性腎症患者や腎硬化症の増加など予後不良な患者の導入が多くなっていることから粗死亡率は年々悪化傾向にある。粗死亡率は、アンケート回収率が低かった1989年の7.9%が最低値であるが、1992年に9.7%と9%を超えて以降、9.2～9.8%の範囲内で推移してきた。2011年に10.2%とはじめて10%を超え、2012年も10.1%であった。