

3) 腹膜透析調査


(1) 腹膜透析 (PD) 患者の現況 (図表31)

PD患者の現況

	人数
腹膜透析	9,510
腹膜カテーテルを残している洗浄患者など	350
腹膜透析新規導入年内脱落患者数	176

HD,HDF等とPDを併用している患者数	1,935
----------------------	-------

施設調査による集計



PD-HD等併用状況	1年未満	1年~	2年~	4年~	8年~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独 (%)	1,280 (95.0)	921 (90.5)	1,162 (83.6)	824 (67.8)	251 (51.6)	4,438 (81.3)	2,894 (78.0)	7,332 (80.0)	2.79	2.84
PD-HD併用週1HD(F) (%)	48 (3.6)	81 (8.0)	185 (13.3)	314 (25.8)	175 (36.0)	803 (14.7)	672 (18.1)	1,475 (16.1)	5.48	3.66
PD-HD併用週2HD(F) (%)	10 (0.7)	6 (0.6)	26 (1.9)	50 (4.1)	42 (8.6)	134 (2.5)	88 (2.4)	222 (2.4)	6.73	4.33
PD-HD併用週3HD(F) (%)	2 (0.1)	3 (0.3)	7 (0.5)	4 (0.3)	4 (0.8)	20 (0.4)	34 (0.9)	54 (0.6)	4.18	3.62
PD-HD併用その他 (%)	8 (0.6)	7 (0.7)	10 (0.7)	23 (1.9)	14 (2.9)	62 (1.1)	23 (0.6)	85 (0.9)	5.78	4.97
合計 (%)	1,348 (100.0)	1,018 (100.0)	1,390 (100.0)	1,215 (100.0)	486 (100.0)	5,457 (100.0)	3,711 (100.0)	9,168 (100.0)	3.32	3.25

集計対象：腹膜透析患者（HD等との併用含む）

解説

2012年末の施設調査では、腹膜透析 (PD) 患者数は9,510名、腹膜カテーテルを残している洗浄患者350名、新規PD導入するも年内脱落した患者176名、HD,HDF等とPDを併用している患者1,935名であった。

PD歴とPD・HD等併用状況双方について5,457名から回答があり、併用療法の割合は1年未満で5.0%なのに対し、1～2年未満で9.5%、2～4年未満で16.4%、4～8年未満で32.2%、8年以上で48.4%とPD歴が長くなるにつれて高くなっていった。併用回数に関しては週1回が8割以上と大多数を占めていたが、週2回、3回の併用患者もPD歴が長くなるほど増えていた。