


## 5) 腎性貧血


### (9) intact PTHとESA抵抗性 (ESAI) (図表53)

ダルベポエチン投与患者におけるintact PTH別ESAI(平均値)



| intact PTH (pg/mL) | 60未満  | 60~   | 120~  | 180~  | 240~  | 300~  | 600~  | 1,000~ | 合計    | 記載なし  | 総計    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| ESAI (平均値)         | 0.058 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.061 | 0.061  | 0.055 | 0.065 | 0.055 |
| 糖尿病あり              | 0.058 | 0.055 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.054 | 0.061 | 0.061  | 0.055 | 0.065 | 0.055 |
| 糖尿病なし              | 0.065 | 0.061 | 0.058 | 0.058 | 0.058 | 0.061 | 0.061 | 0.067  | 0.060 | 0.072 | 0.061 |

エポエチンベータペゴル投与患者におけるintact PTH別ESAI(平均値)



| intact PTH (pg/mL) | 60未満  | 60~   | 120~  | 180~  | 240~  | 300~  | 600~  | 1,000~ | 合計    | 記載なし  | 総計    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| ESAI (平均値)         | 0.215 | 0.202 | 0.191 | 0.179 | 0.183 | 0.190 | 0.199 | 0.215  | 0.197 | 0.236 | 0.199 |
| 糖尿病あり              | 0.215 | 0.202 | 0.191 | 0.179 | 0.183 | 0.190 | 0.199 | 0.215  | 0.197 | 0.236 | 0.199 |
| 糖尿病なし              | 0.234 | 0.219 | 0.209 | 0.216 | 0.211 | 0.207 | 0.226 | 0.236  | 0.218 | 0.263 | 0.219 |

集計対象：施設血液透析患者

#### 解説

intact PTH濃度とESAIはPTH濃度が高くても低くてもESAIが上昇する、U字型の関係であった。この関連は糖尿病の有無やESA製剤の種類に関わらず見られた。