



## 6) 血圧・喫煙・脂質異常症

### (3) 喫煙の有無と年齢・性別 (図表58)



年齢	15歳未満	15歳~	30歳~	45歳~	60歳~	75歳~	90歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
現在喫煙あり (%)	0 (0.0)	100 (12.2)	2,186 (20.8)	7,527 (19.6)	11,569 (13.0)	2,970 (6.0)	69 (3.8)	24,421 (12.9)	0 (0.0)	0	24,421 (12.9)	61.10	11.67
現在喫煙なし (%)	44 (62.9)	502 (61.3)	5,616 (53.5)	20,850 (54.4)	54,331 (61.2)	33,794 (68.4)	1,263 (69.1)	116,400 (61.3)	2 (66.7)	0	116,402 (61.3)	67.14	12.27
不明・記載なし (%)	26 (37.1)	217 (26.5)	2,705 (25.7)	9,946 (26.0)	22,893 (25.8)	12,661 (25.6)	496 (27.1)	48,944 (25.8)	1 (33.3)	0	48,945 (25.8)	66.05	12.42
総計 (%)	70 (100.0)	819 (100.0)	10,507 (100.0)	38,323 (100.0)	88,793 (100.0)	49,425 (100.0)	1,828 (100.0)	189,765 (100.0)	3 (100.0)	0	189,768 (100.0)	66.08	12.39



年齢	15歳未満	15歳~	30歳~	45歳~	60歳~	75歳~	90歳~	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
現在喫煙あり (%)	0 (0.0)	19 (4.8)	487 (9.8)	1,286 (6.8)	1,954 (4.0)	616 (1.8)	36 (1.5)	4,398 (4.0)	0 (0.0)	0	4,398 (4.0)	61.22	12.61
現在喫煙なし (%)	35 (71.4)	275 (69.6)	3,184 (64.2)	12,874 (68.2)	34,862 (71.0)	25,780 (73.5)	1,840 (74.1)	78,850 (71.1)	2 (50.0)	0	78,852 (71.1)	68.63	12.55
不明・記載なし (%)	14 (28.6)	101 (25.6)	1,286 (25.9)	4,720 (25.0)	12,268 (25.0)	8,701 (24.8)	606 (24.4)	27,696 (25.0)	2 (50.0)	0	27,698 (25.0)	68.10	12.75
総計 (%)	49 (100.0)	395 (100.0)	4,957 (100.0)	18,880 (100.0)	49,084 (100.0)	35,097 (100.0)	2,482 (100.0)	110,944 (100.0)	4 (100.0)	0	110,948 (100.0)	68.20	12.69

集計対象：透析患者全体

#### 解説

調査時点での喫煙習慣と年齢の関係を男女別に示した。男性においては、全体の12.9%が現在喫煙ありと確認され、30歳以上45歳未満の20.8%が最高で、より若年・より高齢の年齢層では喫煙者の割合が低い傾向がある。女性では、全体の4.0%に現在喫煙が確認され、男性よりも低い割合であった。また、30歳以上45歳未満の9.8%が最高で、より若年・より高齢の年齢層では喫煙者の割合が低い傾向は男性と同様であった。

なお、情報不足で喫煙の有無を確認できなかった症例が男性の25.8%、女性の25.0%にみられた。これらの症例を除いた場合、男女を合わせた透析患者全体での喫煙割合は12.9%となり、2001年末調査における20.1%より減少している。