


5) 死亡原因

(2) 導入患者の死亡年齢層別死因分布 (図表22)



死因	~44歳	45歳~64歳	65歳~74歳	75歳~84歳	85歳~	合計	不明	記載なし	総計
心不全 (%)	5 (17.9)	47 (19.1)	111 (22.2)	249 (25.2)	138 (26.0)	550 (24.0)	2	0	552 (24.0)
脳血管障害 (%)	2 (7.1)	19 (7.7)	44 (8.8)	59 (6.0)	19 (3.6)	143 (6.2)	1	0	144 (6.3)
感染症 (%)	6 (21.4)	51 (20.7)	117 (23.4)	277 (28.1)	143 (26.9)	594 (25.9)	1	0	595 (25.9)
消化管出血 (%)	1 (3.6)	7 (2.8)	6 (1.2)	21 (2.1)	11 (2.1)	46 (2.0)	0	0	46 (2.0)
悪性腫瘍 (%)	3 (10.7)	47 (19.1)	74 (14.8)	111 (11.2)	43 (8.1)	278 (12.1)	1	0	279 (12.1)
悪液質/尿毒症 (%)	0 (0.0)	9 (3.7)	18 (3.6)	40 (4.1)	33 (6.2)	100 (4.4)	0	0	100 (4.3)
心筋梗塞 (%)	1 (3.6)	7 (2.8)	13 (2.6)	31 (3.1)	15 (2.8)	67 (2.9)	0	0	67 (2.9)
カリウム中毒/頓死 (%)	2 (7.1)	5 (2.0)	9 (1.8)	14 (1.4)	7 (1.3)	37 (1.6)	0	0	37 (1.6)
その他 (%)	5 (17.9)	38 (15.4)	74 (14.8)	126 (12.8)	80 (15.1)	323 (14.1)	1	0	324 (14.1)
不明 (%)	3 (10.7)	16 (6.5)	34 (6.8)	59 (6.0)	42 (7.9)	154 (6.7)	1	0	155 (6.7)
合計 (%)	28 (100.0)	246 (100.0)	500 (100.0)	987 (100.0)	531 (100.0)	2,292 (100.0)	7	0	2,299 (100.0)
記載なし	0	2	0	5	3	10	0	0	10
総計	28	248	500	992	534	2,302	7	0	2,309

患者調査による集計

解説

2013年新規導入患者で、2013年末までに亡くなった患者の各年齢層別死因の内訳を集計した。心不全、感染症、悪液質/尿毒症の死亡患者に占める割合は高齢になるに従って増加した。一方、脳血管障害、カリウム中毒/頓死は高齢になるほど死亡患者に占める割合は減少した。なお、悪性腫瘍については、45歳~64歳で割合が高かった。