


5) 死亡原因

(4) 2013年死亡患者の死亡原因分類 (図表24)



死因	男性	女性	合計	記載なし	総計	死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全 (%)	4,799 (25.7)	3,000 (28.8)	7,799 (26.9)	0 (0.0)	7,799 (26.9)	自殺/拒否 (%)	157 (0.8)	54 (0.5)	211 (0.7)	0 (0.0)	211 (0.7)
脳血管障害 (%)	1,275 (6.8)	806 (7.7)	2,081 (7.2)	0 (0.0)	2,081 (7.2)	腸閉塞 (%)	170 (0.9)	126 (1.2)	296 (1.0)	0 (0.0)	296 (1.0)
感染症 (%)	3,962 (21.3)	2,081 (20.0)	6,043 (20.8)	0 (0.0)	6,043 (20.8)	肺血栓/肺栓塞 (%)	59 (0.3)	25 (0.2)	84 (0.3)	0 (0.0)	84 (0.3)
消化管出血 (%)	281 (1.5)	169 (1.6)	450 (1.5)	0 (0.0)	450 (1.5)	災害・事故死 (%)	118 (0.6)	36 (0.3)	154 (0.5)	0 (0.0)	154 (0.5)
悪性腫瘍 (%)	2,018 (10.8)	712 (6.8)	2,730 (9.4)	0 (0.0)	2,730 (9.4)	その他 (%)	1,489 (8.0)	1,061 (10.2)	2,550 (8.8)	0 (0.0)	2,550 (8.8)
悪液質/尿毒症 (%)	667 (3.6)	545 (5.2)	1,212 (4.2)	0 (0.0)	1,212 (4.2)	不明 (%)	2,085 (11.2)	1,046 (10.1)	3,131 (10.8)	0 (0.0)	3,131 (10.8)
心筋梗塞 (%)	850 (4.6)	390 (3.7)	1,240 (4.3)	0 (0.0)	1,240 (4.3)	合計 (%)	18,641 (100.0)	10,401 (100.0)	29,042 (100.0)	0 (0.0)	29,042 (100.0)
カリウム中毒/頓死 (%)	518 (2.8)	257 (2.5)	775 (2.7)	0 (0.0)	775 (2.7)	記載なし	24	15	39	0	39
肝硬変症 (%)	193 (1.0)	93 (0.9)	286 (1.0)	0 (0.0)	286 (1.0)	総計	18,665	10,416	29,081	0	29,081

患者調査による集計

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

解説

2013年では、施設調査票で30,708人の死亡が報告されている。うち患者調査票に記載されている死亡患者は29,081人であり、2012年と比べ383人減少した。患者調査表に死亡原因と性別が記載された29,042人で検討すると、男性では心不全(25.7%)、感染症(21.3%)、悪性腫瘍(10.8%)、脳血管障害(6.8%)の順であった。女性では心不全(28.8%)、感染症(20.0%)、脳血管障害(7.7%)、悪性腫瘍(6.8%)の順であった。全体では心不全(26.9%)、感染症(20.8%)、悪性腫瘍(9.4%)、脳血管障害(7.2%)の順であった。性別ごと、全体の死因ともその順番は2012年と変わらなかった。心不全、脳血管障害、心筋梗塞を併せた心血管疾患の割合は、全体で38.3%、男性では37.1%、女性では40.3%であった。