

3) 腹膜透析調査


(1) 腹膜透析 (PD) 患者の現況 (図表37)

PD患者の現況

	人数
腹膜透析	9,245
腹膜カテーテルを残している洗浄患者など	293
腹膜透析新規導入年内脱落患者数	161

HD,HDF等とPDを併用している患者数	1,900
----------------------	-------

施設調査による集計



PD・HD等併用状況	1年未満	1年～	2年～	4年～	8年～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
PD単独 (%)	1,177 (96.2)	1,061 (91.0)	1,172 (84.1)	886 (68.2)	227 (45.9)	4,523 (81.1)	2,706 (77.9)	7,229 (79.9)	2.81	2.79
PD-HD併用週1HDF (%)	40 (3.3)	91 (7.8)	182 (13.1)	352 (27.1)	207 (41.8)	872 (15.6)	651 (18.7)	1,523 (16.8)	5.87	4.12
PD-HD併用週2HDF (%)	2 (0.2)	4 (0.3)	19 (1.4)	44 (3.4)	38 (7.7)	107 (1.9)	69 (2.0)	176 (1.9)	7.18	4.03
PD-HD併用週3HDF (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	3 (0.2)	1 (0.1)	5 (1.0)	11 (0.2)	24 (0.7)	35 (0.4)	6.08	4.01
PD-HD併用その他 (%)	3 (0.2)	9 (0.8)	17 (1.2)	16 (1.2)	18 (3.6)	63 (1.1)	24 (0.7)	87 (1.0)	5.92	4.68
合計 (%)	1,223 (100.0)	1,166 (100.0)	1,393 (100.0)	1,299 (100.0)	495 (100.0)	5,576 (100.0)	3,474 (100.0)	9,050 (100.0)	3.42	3.34

集計対象：腹膜透析患者（HD等との併用含む）

解説

2013年末の施設調査では、腹膜透析 (PD) 患者数は9,245名で2012年末と比較し269名減少した。腹膜カテーテルを残している洗浄患者は293名、新規PD導入するも2013年内に脱落した患者161名、HD、HDF等とPDを併用している患者が1,900名であった。

PD歴とPD・HD等併用状況の双方について5,576名から回答があった。併用療法の割合はPD歴1年未満で3.8%なのに対し、1～2年未満で9.0%、2～4年未満で15.9%、4～8年未満で31.8%、8年以上で54.1%とPD歴が長くなるにつれて高くなっていった。併用回数に関しては週1回が8割以上と大多数を占めていた。