


1) 慢性透析療法の現況

(10) 年末患者の原疾患と性別 (図表10)



原疾患	男性	女性	合計	記載なし	総計
糖尿病性腎症 (%)	87,441 (42.5)	36,216 (32.0)	123,657 (38.8)	0	123,657
慢性糸球体腎炎 (%)	55,309 (26.9)	36,474 (32.2)	91,783 (28.8)	0	91,783
腎硬化症 (%)	21,085 (10.2)	10,565 (9.3)	31,650 (9.9)	0	31,650
多発性嚢胞腎 (%)	6,270 (3.0)	5,201 (4.6)	11,471 (3.6)	0	11,471
慢性腎盂腎炎 (%)	1,351 (0.7)	1,545 (1.4)	2,896 (0.9)	0	2,896
急速進行性糸球体腎炎 (%)	1,301 (0.6)	1,237 (1.1)	2,538 (0.8)	0	2,538
SLE腎炎 (%)	713 (0.3)	1,509 (1.3)	2,222 (0.7)	0	2,222
悪性高血圧 (%)	1,848 (0.9)	873 (0.8)	2,721 (0.9)	0	2,721
妊娠腎／妊娠中毒症 (%)	0 (0.0)	1,483 (1.3)	1,483 (0.5)	0	1,483
その他の分類不能の腎炎 (%)	869 (0.4)	585 (0.5)	1,454 (0.5)	0	1,454
アミロイド腎 (%)	181 (0.1)	257 (0.2)	438 (0.1)	0	438
痛風腎 (%)	923 (0.4)	133 (0.1)	1,056 (0.3)	0	1,056
先天性代謝異常による腎不全 (%)	170 (0.1)	111 (0.1)	281 (0.1)	0	281

原疾患	男性	女性	合計	記載なし	総計
腎・尿路結核 (%)	85 (0.0)	83 (0.1)	168 (0.1)	0	168
腎・尿路結石 (%)	381 (0.2)	197 (0.2)	578 (0.2)	0	578
腎・尿路腫瘍 (%)	742 (0.4)	217 (0.2)	959 (0.3)	0	959
閉塞性尿路障害 (%)	490 (0.2)	253 (0.2)	743 (0.2)	0	743
骨髄腫 (%)	192 (0.1)	131 (0.1)	323 (0.1)	0	323
腎形成不全 (%)	414 (0.2)	250 (0.2)	664 (0.2)	0	664
再導入 (%)	1,428 (0.7)	746 (0.7)	2,174 (0.7)	0	2,174
その他 (%)	5,220 (2.5)	3,218 (2.8)	8,438 (2.6)	0	8,438
不明 (%)	19,510 (9.5)	11,901 (10.5)	31,411 (9.8)	1	31,412
合計 (%)	205,923 (100.0)	113,185 (100.0)	319,108 (100.0)	1	319,109
記載なし	0	0	0	0	0
総計	205,923	113,185	319,108	1	319,109

患者調査による集計

解説

2016年末患者の原疾患の第一位は糖尿病性腎症、第二位は慢性糸球体腎炎、第三位は腎硬化症であり、それぞれ38.8%、28.8%、9.9%であった。原疾患不明は9.8%であった。男性では糖尿病性腎症が42.5%、慢性糸球体腎炎が26.9%であるのに対して、女性ではそれぞれ32.0%、32.2%と、男女間で原疾患の割合に差を認めた。全体では男性患者数が多いにもかかわらず、慢性腎盂腎炎、SLE腎炎、アミロイド腎では、女性患者数が男性患者数を上まわっていた。