


2) 透析導入患者

(2) 導入患者の原疾患と性別 (図表15)



原疾患	男性	女性	合計	記載なし	総計
糖尿病性腎症 (%)	11,792 (46.2)	4,311 (36.7)	16,103 (43.2)	0	16,103
慢性糸球体腎炎 (%)	4,007 (15.7)	2,179 (18.6)	6,186 (16.6)	0	6,186
腎硬化症 (%)	3,674 (14.4)	1,611 (13.7)	5,285 (14.2)	0	5,285
多発性嚢胞腎 (%)	549 (2.2)	423 (3.6)	972 (2.6)	0	972
慢性腎盂腎炎 (%)	138 (0.5)	120 (1.0)	258 (0.7)	0	258
急速進行性糸球体腎炎 (%)	242 (0.9)	233 (2.0)	475 (1.3)	0	475
SLE腎炎 (%)	86 (0.3)	133 (1.1)	219 (0.6)	0	219
悪性高血圧 (%)	201 (0.8)	89 (0.8)	290 (0.8)	0	290
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)	0 (0.0)	24 (0.2)	24 (0.1)	0	24
その他の分類不能の腎炎 (%)	107 (0.4)	62 (0.5)	169 (0.5)	0	169
アミロイド腎 (%)	33 (0.1)	47 (0.4)	80 (0.2)	0	80
痛風腎 (%)	61 (0.2)	11 (0.1)	72 (0.2)	0	72
先天性代謝異常による腎不全 (%)	15 (0.1)	8 (0.1)	23 (0.1)	0	23

原疾患	男性	女性	合計	記載なし	総計
腎・尿路結核 (%)	7 (0.0)	2 (0.0)	9 (0.0)	0	9
腎・尿路結石 (%)	33 (0.1)	22 (0.2)	55 (0.1)	0	55
腎・尿路腫瘍 (%)	150 (0.6)	41 (0.3)	191 (0.5)	0	191
閉塞性尿路障害 (%)	61 (0.2)	29 (0.2)	90 (0.2)	0	90
骨髄腫 (%)	80 (0.3)	73 (0.6)	153 (0.4)	0	153
腎形成不全 (%)	34 (0.1)	13 (0.1)	47 (0.1)	0	47
再導入	159 (0.6)	79 (0.7)	238 (0.6)	0	238
その他 (%)	1,001 (3.9)	551 (4.7)	1,552 (4.2)	0	1,552
不明 (%)	3,077 (12.1)	1,683 (14.3)	4,760 (12.8)	1	4,761
合計 (%)	25,507 (100.0)	11,744 (100.0)	37,251 (100.0)	1	37,252
記載なし	0	0	0	0	0
総計	25,507	11,744	37,251	1	37,252

患者調査による集計

解説

2016年導入患者における主要原疾患の第一位は糖尿病性腎症で43.2%、第二位が慢性糸球体腎炎で16.6%、第三位が腎硬化症で14.2%であり、原疾患不明は12.8%であった。糖尿病性腎症においては男性が46.2%、女性が36.7%と差を認めた。慢性糸球体腎炎および腎硬化症では、男女間に差を認めなかった。全体では男性患者数が多いのにもかかわらず、SLE腎炎、アミロイド腎では、女性患者数が男性患者数を上まわっていた。