



5) 腹膜透析

(2) PD+HD (F) 併用療法の状況 (図表30)



| 併用状況 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PD単独 | 6,022 | 7,436 | 7,370 | 7,323 | 7,324 | 7,188 | 7,104 | 6,931 |
| PD+週1回 HD(F)併用 | 1,197 | 1,388 | 1,393 | 1,428 | 1,503 | 1,544 | 1,470 | 1,496 |
| PD+週2回 HD(F)併用 | 191 | 225 | 224 | 219 | 173 | 177 | 172 | 165 |
| PD+週3回 HD(F)併用 | 53 | 51 | 46 | 55 | 34 | 40 | 29 | 37 |
| PD+その他の併用療法 | 128 | 130 | 105 | 86 | 87 | 73 | 71 | 64 |
| 合計 | 7,591 | 9,230 | 9,138 | 9,111 | 9,121 | 9,022 | 8,846 | 8,693 |



| 併用状況 | 1年未満 | 1年～ | 2年～ | 4年～ | 6年～ | 8年～ | 10年～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|----------------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|------|------|
| PD単独 | 1,269 | 1,115 | 1,270 | 591 | 238 | 89 | 102 | 4,674 | 2,257 | 6,931 | 2.64 | 2.62 |
| PD+週1回 HD(F)併用 | 42 | 80 | 232 | 214 | 156 | 87 | 99 | 910 | 586 | 1,496 | 5.55 | 3.68 |
| PD+週2回 HD(F)併用 | 1 | 6 | 15 | 20 | 14 | 4 | 14 | 74 | 91 | 165 | 6.65 | 4.91 |
| PD+週3回 HD(F)併用 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 29 | 37 | 5.82 | 4.88 |
| PD+その他の併用療法 | 1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 2 | 8 | 41 | 23 | 64 | 6.26 | 4.84 |
| 合計 | 1,313 | 1,210 | 1,529 | 832 | 416 | 182 | 225 | 5,707 | 2,986 | 8,693 | 3.19 | 3.11 |

集計対象：腹膜透析患者（併用患者含む）

解説

2016年のPD単独の患者数はPD患者全体の79.7%であり、その全体における割合は経年的に変わらなかった。また、PDとHD (F) を併用している患者の割合も、経年的な変化を認めなかった。

PD歴別の併用状況を見ると、PD歴が長くなるにつれて、PD単独の患者比率は低下し、HD (F) を併用している患者の割合は増加した。HD (F) の併用回数については、週1回が最も多く、PD歴8年以上になると、PD患者の53.1%がHD (F) を併用していた。